

BIF₄

Budapesti

Immunológiai Fórum

2015. december 3-5.

Park Inn by Radisson Budapest



PROGRAM

ARANY FOKOZATÚ EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK



Bristol-Myers Squibb



EZÜST FOKOZATÚ EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK



BRONZ FOKOZATÚ EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK

abbvie



TOVÁBBI EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK

Amgen Kft.

Berlin-Chemie/A. Menarini Kft.

Humán BioPlazma Kft.

TEVA Gyógyszergyár Zrt.

UCB Magyarország Kft.

Az axiális spondyloarthritis két különböző formája. Ugyanaz a SIMPONI kezelés.

A SIMPONI segít az axiális spondyloarthritis kezelésében, legyen szó akár a nem-radiológiai axiális spondyloarthritis-ről, akár a spondylitis ankylopoetica-ról!

SIMPONI (golimumab) 50 mg oldatos injekció előretöltött injekciós tollban (1x), ill. előretöltött fecskendőben (1x) (fogyasztói ára: 318 740 Ft; tb-támogatás: 100%, tételes elszámolás alá eső készítmény a 70/2011. (XII. 23.) és a 2/2012. (I. 3.) NEFMI rendeletek alapján [esetleges változások: www.oep.hu]). **Javallatok:** 1. Rheumatoid arthritis (RA): metotrexattal (MTX) kombinálva: közepesen súlyos/súlyos aktív RA kezelésére felnőtteknél, ha a betegség lefolyását módosító rheuma elleni gyógyszerekkel (DMARD-ok, beleértve a MTX-et is) a terápias válasz nem volt megfelelő; súlyos, aktív, progresszív RA kezelésére korábban MTX-tal nem kezelt felnőtteknél. 2. Aktív és progresszív arthritis psoriatica (APS) kezelésére felnőtteknél monoterápiában v. MTX-tal kombinálva, ha a korábbi DMARD-ok hatása nem volt megfelelő. 3. Axiális spondyloarthritis: súlyos, aktív spondylitis ankylopoetica (SA) kezelésére felnőtteknél, akik nem reagáltak megfelelően a hagyományos kezelésre; a gyulladás objektív tüneteit mutató (melyet emelkedett C-reaktív protein szint (CRP) és/vagy MRI vizsgálati eredmény igazol) súlyos, aktív, nem-radiológiai axiális spondyloarthritis (nr-axiális SpA) kezelésére felnőtteknél, amennyiben az előzetesen alkalmazott nem szteroid gyulladásgátló szerrel (NSAID) történt kezelés hatása nem volt megfelelő, vagy NSAID intolerancia áll fenn. 4. Középsúlyos-súlyos colitis ulcerosa (CU) kezelésére felnőtteknél, akik nem reagáltak megfelelően a hagyományos kezelésre, beleértve a kortikoszteroidokat, a 6-merkaptopurint v. az azatioprint is, vagy ezeket a kezeléseket nem tolerálták, ill. azokkal szemben orvosi ellenjavallat áll fenn. **Ellenjavallatok:** a készítmény hatóanyagával v. bármely segédanyagával szembeni túlérzékenység. Aktív tuberkulózis (tbc) v. egyéb súlyos fertőzés, pl. szepszis, oportunistá fertőzések. Közepesen súlyos v. súlyos szívelégtelenség (NYHA III/IV stádium). **Adagolás és alkalmazás:** a kezelést csak RA, APS, SA, nr-axiális SpA vagy CU diagnosztizálásában és kezelésében jártas szakorvos kezdeményezheti és felügyelheti. A SIMPONI-val kezelt betegeknek egy Betegájékoztató kártyát kell kapniuk. Adagja RA, APS, SA, nr-axiális SpA esetén havonta 1x 50 mg sc., a hónapnak ugyanazon a napján adva, RA-ben MTX-tal kombinálva. CU esetén a kezdő adag 200 mg, melyet a 2. héten 100 mg, majd ezután minden 4. héten a 80 kg-nál kisebb testtömegű betegeknek 50 mg, a 80 kg v. ennél nagyobb testtömegű betegeknek 100 mg követ. A fenntartó kezelés során a kortikoszteroidok fokozatosan leállíthatók a klinikai gyakorlati útmutatóknak megfelelően. A klinikai válasz rendszerint 12-14 hét(3-4 dózis) után

jelentkezik. Ha ebben az időszakban nem mutatkozik semmilyen terápiás előny, a kezelés folytatását át kell gondolni. **Figyelmeztetések:** Infekciók: a kezelés előtt, alatt és befejezése után akár 5 hónapig gondosan figyelni kell az infekciókra, beleértve a tbc-t is. A TNF-gátlót kapók fogékonyabbak a súlyos fertőzésekre. A kezelés előtt vizsgálni kell az aktív v. inaktív látens) tbc és a HBV-fertőzés meglétét. Aktív tbc: SIMPONI-kezelést tilos kezdeni. Látens tbc: megfelelő tbc elleni terápiát kell kezdeni a SIMPONI-kezelés megkezdése előtt. A SIMPONI-kezelés alatt gondosan ellenőrizni kell az aktív tbc-re utaló panaszokat és tüneteket. SIMPONI-kezelést igénylő, HBV-t hordozó betegek: a kezelés alatt és befejezése után több hónapig gondosan figyelni kell a reaktiválódás jeleire. A HBV reaktiválódásának megelőzésére TNF-gáttal egyidejűleg adott antivirális terápia hatásossága nem ismert. A HBV reaktiválódása esetén a SIMPONI-kezelést meg kell szakítani, és hatáscos antivirális terápiát, megfelelő szuppresszív kezelést kell kezdeni. Rosszindulatú daganatok és lymphoproliferatív betegségek: TNF-gáttal kezelteknek a lymphomák, leukémia v. egyéb malignitások kifejlődésének kockázata nem zárható ki. TNF-gátló-kezelés kezdését gondosan mérlegelni kell, ha a körülményben rosszindulatú daganat szerepel, ill. megfontolandó a kezelés folytatása, ha malignitás alakul ki. A hepatosplenikus T-sejtes lymphoma kialakulásának kockázata TNF-gáttal kezelt betegek esetében nem zárható ki: az AZA v. 6-MP és a SIMPONI kombinációjának potenciális veszélye megfontolást igényel. Azon betegeknek, akiknek történetében vastagbél dysplasia v. carcinoma szerepel, vagy akiknél fokozott ezek kialakulásának veszélye, rendszeres időközönként ezek szűrővizsgálatokat kell végezni a kezelés megkezdése előtt, valamint a betegség fennállásának ideje alatt, ill. akiknél újonnan diagnosztizáltak dysplasiát, át kell gondolni, hogy a terápia folytatható-e. A TNF-gátló alkalmazása körültekintően igényel COPD-s, valamint a malignitások szempontjából az erős dohányzás miatt magasabb kockázatu betegek esetén. Időszakos bőrvizsgálat javasolt, különösen a bőrreakciókat tényezővel rendelkező betegeknek. Pangásos szívelégtelenség: körültekintően kell alkalmazni enyhé szívelégtelenségben (NYHA I/II). Neurológiai események: demyelinisációs körkép esetén a kezelés előtt gondosan mérlegelni kell annak előnyeit és kockázatait. Ha ezek a körképek kialakulnak, mérlegelni kell a kezelés leállítását. Sebészeti beavatkozások: tervezésükkor figyelembe kell venni a hosszú kezelési időt. A kezelés alatt műtétet megelőzően figyelni kell a fertőzések kialakulására, és meg kell

tenni a megfelelő intézkedéseket. Autoimmun folyamatok: lupus-szerű szindrómára utaló tünetek és kétszálú DNS elleni antitest-pozitivitás esetén a kezelés abba kell hagyni. Hematológiai reakciók: a kezelés leállítását megerősített, jelentős hematológiai eltéréseknél meg kell fontolni. Változás biológiai DMARD-ok között: figyelni kell a fertőzések kialakulásának jeleire. Allergiás reakciók: súlyos allergiás reakció esetén a SIMPONI adását azonnal be kell fejezni, és megfelelő kezelést kell kezdeni. Latex szenzitivitás: az injekciós toll tüjének védőkapujának latex tartalmú, az arra érzékenyeknél allergiás reakciót válthat ki. **Különleges betegcsoportok:** idősök (≥65 év) kezelést körültekintően kell végezni, kiemelt figyelmet fordítva a fertőzések előfordulására. Beszűkült vese- v. májműködésű betegeknek nem végeztek specifikus vizsgálatokat. Beszűkült májműködésű betegeknek óvatossággal kell adni. 18 év alatti betegeknek nem igazolták biztonságosságát és hatásosságát. **Interakciók:** SIMPONI és anakira, abatacept v. egyéb biológiai terápiák kombinált alkalmazása nem ajánlott. A SIMPONI-val egyidejűleg fertőző ágensek alkalmazása nem javasolt. Egyidejű MTX-kezelés: az adatok nem utalnak arra, hogy akár a SIMPONI, akár a MTX adagjának megváltoztatására lenne szükség. **Terhesség és szoptatás:** terhes nőknél nem ajánlott. Fogamzóképes nőknél hatékony fogamzásgátlást kell alkalmazniuk, és azt folytatni kell az utolsó adagtól számítva min. 6 hónapig. A kezelés alatt és az utolsó adagtól számítva min. 6 hónapig. A kezelés alatt és az utolsó adagtól számítva min. 6 hónapig. A kezelés alatt és az utolsó adagtól számítva min. 6 hónapig. **Főbb mellékhatások** (≥1%): felső légúti infekciók (nasopharyngitis, pharyngitis, laryngitis, rhinitis), bakteriális fertőzés (cellulitis), alsó légúti fertőzés (pneumonia), vírusfertőzés (influenza, herpes), bronchitis, sinusitis, felületes gombafertőzés, abszcessus, anaemia, allergiás reakciók (bronchospasmus, hyperszenzitivitás, urticaria), autoantitest-pozitivitás, depresszió, álmatlanság, szédülés, fejfájás, paraesthesia, hipertensio, asthma és a kapcsolódó tünetek (szipoló légzés, bronchialis hyperaktivitás), dyspepsia, gastrointestinális és abdominális fájdalom, hányinger, gastrointestinális gyulladáshoz meg-betegedések (gastritis, colitis), stomatitis, ALT/AST-emelkedés, pruritus, kiütés, alopecia, dermatitis, láz, asthenia, az injekció beadási helyén jelentkező reakciók (erythema, urticaria, induratio, fájdalom, véraláfutás, viszketés, irritáció, paraesthesia), mellkasi diszkomfort, csonttörések. **Felírás előtt, kérjük, olvassa el a teljes alkalmazási előírást, különös tekintettel a javallatokra (4.1), az adagolásra (4.2), az ellenjavallatokra (4.3) és a figyelmeztetésekre (4.4) (22/06/2015 EMA/H/C/992/01/061).**

Referenciák: 1. SIMPONI alkalmazási előírás, 22/06/2015 EMA/H/C/992/01/061



MSD Pharma Hungary Kft.

1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 8., Telefon: 06-1-888-5300, Fax: 06-1-888-5388, hungary_msd@merck.com
A dokumentum lezárásának ideje: 2015. augusztus 31. RHEU-1149995-0007



A Fórum szervezői köszönetüket fejezik ki a cégek által nyújtott támogatásért!

Dec. 3. (csütörtök)	
15.00 – 15.10	Megnyitó, köszöntések
15.10 – 16.20	Klinikai szempontból nélkülözhetetlen alapfogalmak I.
16.20 – 16.50	Kávészünet
16.50 – 18.20	Klinikai szempontból nélkülözhetetlen alapfogalmak II.
18.30	Nyitófogadás

Dec. 4. (péntek)	
8.30 – 10.00	Immunmediált kórképek differenciáldiagnosztikája I.
10.00 – 10.20	Kávészünet
10.20 – 11.50	Mikrobiom-immunológia és immunmediált kórképek differenciáldiagnosztikája II.
11.50 – 13.00	Ebédészünet
13.00 – 14.50	Immunszuppresszió: régi és új módszerek
14.50 – 15.10	Kávészünet
15.10 – 17.00	Újdonságok: a patogenezistől a terápiáig I.
17.00 – 17.20	Kávészünet
17.20 – 18.50	Újdonságok: a patogenezistől a terápiáig II.
18.50 – 19.10	Szünet
19.10 – 20.10	Esti tudományos előadás
21.00 – 24.00	Lovagi vacsora (fakultatív program)

Dec. 5. (szombat)	
9.00 – 10.30	Degeneratív reumatológiai kórképek, fertőzések és autoimmunitás I.
10.30 – 10.50	Kávészünet
10.50 – 12.00	Fertőzések és autoimmunitás II.
12.00 – 12.30	Tesztírás, a Fórum zárása
BIF-hez csatlakozó szponzorált szimpóziumok	
12.30 – 13.30	BMS szimpózium
13.30 – 14.30	AbbVie szimpózium

Részvételi díjak a helyszínen

Normál regisztráció	45.000 Ft (35.433 + ÁFA)
60 év feletti nyugdíjasok	37.000 Ft (29.133 + ÁFA)
PhD hallgatók, rezidensek, szakdolgozók	30.000 Ft (23.622 + ÁFA)
Céges képviselők	37.000 Ft (29.133 + ÁFA)
Napijegy	20.000 Ft (15.748 + ÁFA)

A részvételi díjak 15 000 Ft, a napijegyek 5.000 Ft közvetített étkezést tartalmaznak, mely a számlán külön sorban kerül feltüntetéssel!

A normál regisztráció, a nyugdíjas és a PhD hallgatók, szakdolgozók regisztrációs díja tartalmazza:

- tanfolyamon való részvétel jogát
- kreditpontok jóváírását
- kiállítás megtekintésének jogát
- programfüzetet
- kongresszusi táskát, jegyzetfüzetet, tollat
- kávészüneti ellátást december 3-4-5-én
- a december 3-i nyitófogadást

Céges regisztráció tartalmazza:

- akkreditációs pontokat, amennyiben orvos és tesztet ír
- tanfolyami előadások megtekintésének jogát
- kongresszusi táskát, jegyzetfüzetet, tollat
- kávészüneti ellátást december 3-4-5-én
- a december 3-i nyitófogadást

Napijegy tartalmazza:

- az adott napi tanfolyami előadások megtekintésének jogát
- időarányosan a kreditpontokat
- kiállítás megtekintésének jogát
- kávészüneti ellátást aznapra
- kongresszusi táskát, jegyzetfüzetet, tollat

HELYSZÍNI REGISZTRÁCIÓ NYITVA TARTÁSA

2015. december 3. - csütörtök	13.00 – 19.00
2015. december 4. - péntek	08.00 – 19.00
2015. december 5. - szombat	08.30 – 14.30

A regisztrációs iroda telefonszáma: 30/977-4007

(Csak december 3-4-5-én hívható!)

ELŐADÁSOK

Az MS Powerpoint-ban elkészített, CD-n, DVD-n, vagy pendrive-on elhozott előadásokat kérjük legkésőbb az adott szekció kezdete előtt 1 órával leadni a technikai asztalnál. A pénteki és szombati első szekciók előadásait kérjük előző délután szíveskedjenek leadni. A szoros időbeosztás miatt kérjük a rendelkezésre álló idő pontos betartását! (Az előadások időtartama 20 perc.)

NÉVKITŰZŐ

A kongresszus ideje alatt kérjük a névkitűző használatát a helyszínekre történő belépéshez.

AKKREDITÁCIÓ

A BIF4 reumatológus, klinikai immunológus és allergológus, tüdőgyógyász, belgyógyász szakorvosok, gyógyszerészek, háziorvosok és szakdolgozók számára szabadon választott továbbképző rendezvény. Pontérték: 40 kreditpont sikeres tesztírás után.

TÁRSASÁGI PROGRAMOK, ÉTKEZÉSEK

NYITÓFOGADÁS

2015. december 3. (csütörtök) 18.30

Díját a regisztrált résztvevők és a kísérek díja tartalmazza.

Helyszíne: Park Inn by Radisson Budapest

LOVAGI VACSORA

a Sir Lancelot Lovagi Étteremben

2015. december 4. (péntek) 21.00-24.00

Díját a részvételi díjak nem tartalmazzák!

Díja: 12.700 Ft (10.000 Ft + ÁFA)

A Park Inn és az étterem közötti transzfert díjmentesen biztosítjuk!

EBÉD

December 3-4-5-én a kongresszus helyszínén, a Park Inn by Radisson Budapest éttermében.

Díja: 5.000 Ft (3.937 Ft + ÁFA)/ebéd

PARKOLÁS

Parkolási díj a Park Inn by Radisson Budapest mélygarázsában: 2800 Ft / nap / autó vagy 300 Ft / óra / autó
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a mélygarázsba történő behajtás előtt parkolókartát kell igényelni a szálloda recepciójánál.

PÉNZÜGYEK – SZÁMLÁZÁS

A megrendelt szolgáltatások költségeit a kiállításra kerülő számlán az érvényes jogszabályok szerint tüntettük fel. Számlamódosítás, új számla kiállítása a kongresszus végéig, legkésőbb 2015. december 5-ig lehetséges. Ezen időpont után nem áll módunkban a megrendelésen és az erről kiállított számlán változtatni.

MÓDOSÍTÁSI, LEMONDÁSI FELTÉTELEK

Esetleges módosítást, lemondást díjmentesen szállásdíj, részvételi díj, ebéd esetén 2015. október 20-ig fogadtunk el.

Módosítások, lemondások miatti számlamódosítások díja a rendezvényt megelőzően 2.500 Ft+Áfa.

A rendezvényt követően kizárólag a számla formai módosítása lehetséges, melynek díja 4.000 Ft+Áfa.

A kiszámlázott és írásban le nem mondott szolgáltatások díját a megrendelő köteles megtéríteni, még akkor is, ha azokat nem vette igénybe!

FELELŐSSÉG- ÉS EGYÉB BIZTOSÍTÁS

A kongresszus közzétett részvételi és egyéb díjai nem tartalmaznak baleset-, betegség-, poggyász- és felelősségbiztosítási díjat. Így baleset, betegség és valamely káresemény bekövetkezése esetén a szervezőknek nem áll módjukban semmilyen felelősséget vagy kártérítést vállalni.



TEVA OSZTEOPORÓZIS

AKTÍV D3-VITAMIN PÓTLÁS

alfakalcidol
ALPHA[®]D₃
 AKTÍV pótlás, STABIL mozgás

Alfakalcidolt tartalmazó aktív D-vitamin analóg az időskori osteoporózis kiegészítő kezelésére

- javítja a BMD*-t¹ ■ növeli az izomerőt²
- csökkenti az elesések számát³ időskorban



HU/ALPHAD/15/0007

Készítmény megnevezése	Közfinanszírozás alapjául elfogadott ár	Támogatás összege	Tértési díj	Közgyógyon kivaltható-e
Alpha D3 0,25 mikrogramm 60x lágy kapszula	2155 Ft	0 Ft	2155 Ft	Igen
Alpha D3 1,0 mikrogramm 30x lágy kapszula	2363 Ft	0 Ft	2363 Ft	Igen

2015. október 1-től érvényes árak. Forrás: http://www.oep.hu/teva_menu/szakma_oldalok/gyogyszer_segedeskoz_gyogyfuro_tamogatás

Készítmény megnevezése	Ajánlott bruttó fogyasztói ár
Alpha D3 0,5 mikrogramm 30x lágy kapszula	2155 Ft**

** A termék nem támogatott. A megjelenített ár ajánlott ár, amely alkalmazása a patikák számára nem kötelező, így attól az egyes patikák eltérhetnek.

*BMD: csontsűrűség érték (Bone Mineral Density)

Rövidített alkalmazási előírás: **Alpha D, 0,25 mikrogramm lágy kapszula, Alpha D, 0,50 mikrogramm lágy kapszula, Alpha D, 1 mikrogramm lágy kapszula**
 Hatóanyag: 0,25 mikrogramm, 0,5 mikrogramm, ill. 1 mikrogramm alfakalcidol lágy kapszulaként. **Javallatok:** renalis osteodystrophia, hypoparathyreosis, nutritív és malabszorpciós rachitis és osteomalacia, D-vitamin dependens rachitis és osteomalacia (I. típus), osteoporosis - elsősorban időskori esetekben (II. típus), csökkent csontképzéssel járó (alacsony turnover-ű) szekunder osteoporosis. **Adagolás és alkalmazás:** szájon át történő alkalmazásra. Osteoporosis: az átlagos magyarországi kalcium bevitel (600-800 mg/nap) mellett a napi 0,5 mikrogramm Alpha D3 az ajánlott dózis, ami megfelelő kontroll mellett 1 mikrogrammig emelhető. Egyéb indikációk a kezdő adag általában felnőtteknek naponta 1 mikrogramm, idős betegeknek 0,5 mikrogramm. Szükség esetén a napi adag fokozatosan (2-4 hetente) emelhető 0,25-0,5 mikrogrammmal maximum 3 mikrogrammig. A plazma kalcium és foszfor szintet a kezelés kezdetén hetente, majd a megfelelő adag beállítását követően 2-4 hetente kell ellenőrizni. **Ellenjavallatok:** a készítmény hatóanyagával vagy bármely segédanyagával szembeni túlérzékenység. Hypercalcaemia, hyperphosphataemia, hypercalciuria, Ca-vesekővesség, nephrocalcinosis. D vitamin túladagolás: 20 testtömeg kg alatti gyermeknek nem javallt a magas hatóanyag tartalom miatt. **Leforrósbabb mellékhatások:** hypercalcaemia, hypercalciuria. A férgekombba hozottai engedély jogsúllta: TEVA Gyógyszergyár Zrt., 4042 Debrecen, Pallagi út. Az utolsó jóváhagyott alkalmazási előírás dátuma: 2014. 06. 30.
Bővebb információért olvassa el a gyógyszer alkalmazási előírását!
 Gyógyszerismertető anyag lezárásának dátuma: 2015. szeptember 13.
 Hivatkozás: 1., Richey F. et al. *Calcif Tissue Int* 2005;76:176-186 2., Scharla SH, et al. *J Rheumatol* 2005;76:26-32 3., Runge M, et al. *Musculoskelet Neuronal Interact* 2005;5(2):127-134



TEVA Gyógyszergyár Zrt.
 4042 Debrecen, Pallagi út 13.
 Levelezési cím: 1134 Budapest, Váci út 29. Vision Towers.
 Telefon: (1) 288 6400, Fax: (1) 288-6410
 További információk: www.teva.hu

TEVA OSZTEOPORÓZIS
 Szilárd védelem, teste szabva

PROGRAM - 2015. december 3. csütörtök

15.00–15.10 Megnyitó, köszöntések

15.10–16.20 Tudományos előadások

Klinikai szempontból nélkülözhetetlen alapfogalmak I.

Üléselnökök: Erdei Anna és Rajnavölgyi Éva

Rajnavölgyi Éva: A sejtközvetítette immunválasz

Erdei Anna: A humorális immunválasz

Kacs Kovics Imre: A terápiás ellenanyagok farmakokinetikája

16.20–16.50 Kávészünet

16.50–18.20 Tudományos előadások

Klinikai szempontból nélkülözhetetlen alapfogalmak II.

Üléselnökök: Lakatos Péter és Ligeti Erzsébet

Ligeti Erzsébet: A fagociták szerepe az immunválaszban

Lakatos Péter: Oszteoimmunológia

Szekeres László: Hosszú távú klinikai hatékonyság denosumabbal

(szponzorált előadás, Amgen)

Ronald van Vollenhoven: Biomarkers for predicting response to therapy in RA: still a pipe-dream, or just around the corner

18.30 Nyitófogadás



08.30–10.00 Tudományos előadások

Immunmediált kórképek differenciáldiagnosztikája I.

Üléselelnökök: Czirják László és Kovács László

Czirják László: A szisztémás autoimmun kórképek differenciáldiagnosztikájának szempontjai

Kovács László: Mikor gondoljunk vasculitisre?

Deák György: Veseérintettség autoimmun kórképekben

Müller Veronika: A tüdő autoimmun betegségei

10.00–10.20 Kávészünet

10.20–11.50 Tudományos előadások

Mikrobiom-immunológia és immunmediált kórképek differenciáldiagnosztikája II.

Üléselelnökök: Falus András és Komoly Sámuel

Falus András: Ízületeink barátja és ellensége: a sokarcú mikrobiom

Dankó Katalin: Ko-stimuláció gátlás a klinikai gyakorlatban

(szponzorált előadás, BMS)

Komoly Sámuel: Az idegrendszer immunmediált betegségei

Czirják László: Tocilizumab : a teljes remisszió lehetősége akár MTX nélkül is.

(szponzorált előadás, Roche)

11.50–13.00 Ebédészünet

13.00–14.50 Tudományos előadások

Immunsuppresszió: régi és új módszerek

Üléselelnökök: Mócsai Attila és Nagy György

Sütő Gábor: Szteroidok és hagyományos DMARD-kezelés

Szántó Sándor: Citokingátlás

Nagy György: T-sejt- és B-sejt-gátló gyógyszerek

Mócsai Attila: A kinázgátlás múltja, jelene és jövője

Németh Tamás: Plazmaferézis és IVIG-kezelés

14.50–15.10 Kávészünet

15.10–17.00 Tudományos előadások

Újdonságok: a patogenezistől a terápiáig I.

Üléselelnökök: Dankó Katalin és Poór Gyula

Szűcs Gabriella: Szisztémás sclerosis

Kiss Emese Virág: SLE

Dankó Katalin: Myositisek

Poór Gyula: Köszvény

Szűcs Gabriella: Immunogenitás a gyakorlatban

(szponzorált előadás, Pfizer)

17.00–17.20 Kávészünet

17.20–18.50 Tudományos előadások

Újdonságok: a patogenezistől a terápiáig II.

Üléselelnökök: Kemény Lajos és Zeher Margit

Kemény Lajos: Psoriasis

Czirják László: a PREMIER és a DE019 vizsgálatok radiológiai eredményeinek integrált értékelése

(szponzorált előadás, Abbvie)

Herszényi László: Gyulladásos bélbetegségek

Zeher Margit: Sjögren-szindróma: "state of the art"

18.50–19.10 Szünet

19.10–20.10 Esti tudományos előadás

21.00 –24.00 Lovagi vacsora (fakultatív program)



09.00–10.30 Tudományos előadások**Degeneratív reumatológiai kórképek, fertőzések és autoimmunitás I.**

Ülélnökök: Géher Pál és Szekanecz Zoltán

Szekanecz Zoltán: Immunológiai mechanizmusok degeneratív reumatológiai kórképekben

Balog Attila: Fertőzések oki szerepe az autoimmunitásban

Géher Pál: A spondylarthritisek patogenezise és klinikai formái

Banai János: A biológiai terápia és a fertőzések

(szponzorált előadás, MSD)

10.30–10.50 Kávészünet**10.50–12.00 Tudományos előadások****Fertőzések és autoimmunitás II.**

Ülélnökök: Kulcsár Andrea és Ludwig Endre

Kiss Emese: Az MTX terápia helye az immunológiai kórképek kezelésében

(szponzorált előadás, Sager)

Kulcsár Andrea: Védőoltások alkalmazása krónikus gyulladásos betegségeken

Ludwig Endre: Immunszupprimált betegek fertőzéseinek diagnosztikája és kezelése

12.00–12.30 Tesztírás, a Fórum zárása**BIF-hez csatlakozó szponzorált szimpóziumok****12.30–13.30 BMS szimpózium****preRA - postBIF****Prognózistól a pathogenesisig**

Immunológiai edukációs szimpózium

Ülélnök: Buzás Edit

Mészáros Gabriella: Köszöntő

Szűcs Gabriella: Az immunológiai szinapszis egészségben és kóros folyamatokban

Kiss Emese Virág: Autoantitestek és effektor immunsejtek kóros szerepe RA-ban

13.30–14.30 AbbVie szimpózium**Klinikai gyakorlat és minőségi konzisztencia a biológiai terápiák változó világában**

Ülélnök: Szökő Éva

Gecse Krisztina: Hasonlóságok és különbségek a gyártástechnológiai változások és a biohasonló készítmények fejlesztése között

Wikonkál Norbert: A Humira® (adalimumab) minőségi jellemzőinek állandósága 15 év során

Kiss Emese Virág: A biológiai készítmények klinikai immunogenitása

Szökő Éva: Gyakorlati szempontok és iránymutatások az originális és hasonló biológiai gyógyszerek közötti terápiaváltás vonatkozásában



A SZERVEZŐ BIZOTTSÁG CÍME

Dr. Nagy György

egyetemi docens

Budai Irgalmasrendi Kórház

1023 Budapest, Frankel Leó út 54.

Telefon: (30) 231-3344

Email: gyorgyngy@gmail.com

A SZERVEZŐ IRODA CÍME

CONGRESS & HOBBY SERVICE KFT.

Kongresszus- és Rendezvényszervező Iroda

6701 Szeged, Pf.: 1022.

Telefon: (62) 484-531, 484-532

Fax: (62) 450-014

E-mail: info@congress-service.hu

A RENDEZVÉNY HONLAPJA

<http://congress-service.hu/2015/bif>

