



DROP5

PROGRAMFÜZET

Debrecen, Kölcsey Központ
2014. február 13-15.

Debreceni Reumatológiai
Oktatási Program
(pulmonológia, endokrinológia
és anyagcsere)
Interdiszciplináris Fórum





AMIKOR A KOMBINÁCIÓ NEM LEHETSÉGES

EGY BIOLÓGIAI
MONOTERÁPIA
KIEMELKEDIK*
A TÖBBI KÖZÜL

*A Roactemra az egyetlen olyan biológiai terápia RA-ben, amelyről direkt összehasonlító vizsgálat igazolta, hogy hatékonyabb, mint egy másik biológiai terápia.

Roactemra 20 mg/ml koncentrátum oldatos infúzióhoz.

Minőségi és mennyiségi összetétel: A koncentrátum 20 mg tocilizumabot tartalmaz milliliterenként. A tocilizumab rekombináns DNS-technológiával előállított humanizált, IgG1 monoklonális antitest, humán interleukin-6 (IL-6) receptor antagonistá. 80 mg tocilizumab 4 ml-ben, 200 mg 10 ml-ben, 400 mg 20 ml-ben injekciós üvegenként. **Gyógyszerforma:** koncentrátum oldatos infúzióhoz. **Terápiás javallatok:** A Roactemra metotrexattal (MTX) kombinálva közepesen súlyos vagy súlyos, aktív **rheumatoid arthritis (RA)** kezelésére javasolt olyan felnőtt betegek esetében, akik nem reagáltak megfelelő módon vagy intoleranciát mutattak más, előzőleg alkalmazott, egy vagy több betegségmódosító antireumatikus gyógyszerre (DMARD) vagy tumor nekrotizáló faktor (TNF) antagonistá kezelésére. Ezeknél a betegeknél a Roactemra monoterápiaként is adható metotrexát intolerancia esetén vagy ha a metotrexáttal történő tartós kezelés nem alkalmazható. A Roactemra olyan 2 éves, vagy annál idősebb, aktív **szisztémás juvenilis idiopathiás arthritisben (SJIA)** szenvedő betegek kezelésére javasolt, akik nem reagáltak megfelelő módon az előzőleg alkalmazott, nem-szteroid gyulladásgátlókkal és szisztémás kortikoszteroidokkal végzett kezelésre. A Roactemra monoterápiaként (ha metotrexát intolerancia áll fenn vagy a metotrexát-kezelés nem alkalmazható), vagy metotrexáttal kombinálva adható. A Roactemra metotrexáttal (MTX) kombinálva olyan 2 éves vagy annál idősebb, **poliartikuláris juvenilis idiopathiás arthritisben (PJIA)** (reuma faktor pozitív vagy negatív és kiterjedt oligoarthritis) szenvedő betegek kezelésére javasolt, akik nem reagáltak megfelelő módon az előzőleg alkalmazott MTX-kezelésre. A Roactemra monoterápiaként adható, ha metotrexát intolerancia áll fenn vagy a tartós metotrexát-kezelés nem alkalmazható. **Adagolás és alkalmazás módja:** **RA-s betegek:** A Roactemra javasolt adagja 8 mg/ttkg 4 hetente, hígítás után 1 óráss intravénás infúzióban. 100 kg-nál nagyobb testtömegű betegeknek 800 mg-ot meghaladó infúzióként dózis nem ajánlott. Laboratóriumi eltérések esetén szükséges dózismódosítások megtalálhatók a részletes alkalmazási előírásban. **SJIA-s betegek:** A javasolt adagolás kéthetente egyszer 8 mg/kg 30 kg-os vagy annál nagyobb testtömegű betegeknek, ill. kéthetente egyszer 12 mg/kg 30 kg-nál kisebb testtömegű betegeknek. Az adagot minden egyes alkalommal a beteg testtömege alapján kell kiszámolni. Laboratóriumi eltérések esetén szükséges dózismódosítások megtalálhatók a részletes alkalmazási előírásban. **PJIA-s betegek:** A javasolt adagolás négyhetente egyszer 8 mg/ttkg 30 kg-os vagy annál nagyobb testtömegű betegeknek, ill. négyhetente egyszer 10 mg/ttkg 30 kg-nál kisebb testtömegű betegeknek. Az adagot minden egyes alkalommal a beteg testtömege alapján kell kiszámolni. **Ellenjavallatok:** A készítmény hatóanyagával vagy bármely segédanyagával szembeni túlérzékenység. Aktív, súlyos fertőzések. **Nemkívánatos hatások, mellékhatások RA-ban:** Felső légúti fertőzések, cellulitis, pneumonia, orális herpes simplex, herpes zoster, conjunctivitis, gastritis, bőrkütes, fejfájás, szédülés, májtranszaminázok emelkedése, hipertensio, neutropenia, thrombocytopenia, hypercholesterinaemia. **SJIA és PJIA-ban:** felső légúti fertőzések, nasopharyngitis, hányinger, hasmenés, infúziós reakciók, fejfájás, májtranszamináz értékek emelkedése, neutrofilizáció, csökkenés vérteljesítés, csökkenés, kolesterinszint-emelkedés. **Gyógyszerkölcsönhatások:** A máj CYP450-enzimeinek az IL-6 által gátolt expressziója tocilizumab-kezelés hatására felzabál a gátlás alól, ezért a terápia kezdésekor vagy leállításaakor ellenőrizni kell az egyenleg beállított adagolási, a CYP 450 enzim által metabolizáló gyógyszereket szedő betegeket, mert a terápiás hatás fenntartásához dózismelésre lehet szükség. **Figyelmeztetések:** A Roactemra alkalmazása megfontolandó fennálló diverticulitis esetén. Terhes nőkön történő alkalmazásra nincs megfelelő adat. A Roactemra biztonságosságát és hatékonyságát 2 évnél fiatalabb gyermekek esetében nem igazolták. Nincsenek rendelkezésre álló adatok. **Tárolás:** 2-8 °C között. **Rendelhetőség:** „I” - az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény pontja szerinti rendelőintézet járóbeteg-szellátást vagy fekvőbeteg-szellátást nyújtó szolgáltatók által biztosított körülmények között alkalmazható gyógyszer. **TB támogatás mértéke:** A Termék az egészségügyi szakképzés és továbbképzés finanszírozás kérdéseiről szóló 9/1993 (IV.2.) NM rendelet 1/A-s melléklete alapján a tételes elszámolás alá eső gyógyszerek körébe tartozik. www.teteles.ong.hu **Fogyasztói ár:** 209.318,- Ft /400mg 1x, 105.179,- Ft /200mg 1x, 42.695,- Ft /80mg 1x EU tkvi szám: EU/1/08/492/001, EU/1/08/492/003, EU/1/08/492/005. **Az alkalmazási előírás dátuma:** 2013.09.25. **Bővebb információért olvassa el a gyógyszer alkalmazási előírását.** www.ema.europa.eu **További információ:** Roche (Magyarország) Kft., 2040 Budaörs, Edison u. 1. Tel: 06-23-446 800, Fax: 06-23-446 840, Email: info@roche.hu Internet: www.roche.hu

Referencia: Adapted from Gabay C, et al. Ann Rheum Dis 2012;71(Suppl3):152. **Dokumentum zárási dátuma:** 2014.01.20.

DROP5

DROP5

**DEBRECENI REUMATOLÓGIAI OKTATÁSI PROGRAM
(pulmonológia, endokrinológia és anyagcsere)
INTERDISZCIPLINÁRIS FÓRUM**

A Debreceni Egyetem ÁOK
Reumatológiai Tanszéke,
a Magyar Reumatológusok Egyesülete
Észak-Kelet Magyarországi Szekciója,
a Debreceni Akadémiai Bizottság
Reumatológiai Munkabizottsága és
a Magyar Kísérletes és Klinikai Farmakológiai Társaság
Immunológiai Szekciója
szervezésében

Debrecen, 2014. február 13-15.

Tisztelt Kolléganők és Kollégák, kedves Barátaim!

Immáron hat éve, hogy a bőrgyógyászokkal és szemészekkel megrendeztük az első DROP interdiszciplináris konferenciát. Ezzel egy Debrecenhez kötődő, de országos, igen sikeres konferenciasorozatot indítottunk el. Ezúton kerül megrendezésre a DROP5, melynek fő témái ezúttal a tüdőgyógyászat, anyagcsere- és endokrin betegségek. A reumatológusok, tüdőgyógyászok, belgyógyászok, klinikai immunológusok és allergológusok, háziorvosok számára a tanfolyam kötelező szabadon választott, 50 pontra akkreditált. PhD hallgatók 1 pontot kapnak.

Külön öröm számunkra, hogy a harmadik nap egybeesik a DE ÁOK hagyományos Kapcsolat napjával, így rendezvényünk egyben a Kapcsolat napi ünneppsorozat része is, amellyel a szakmai együttműködés, kollegialitás és barátság fontosságát szeretnénk ismét demonstrálni.

Ismét sikerült több mint 40 kiváló hazai és két külföldi előadót „megnyernünk az ügynek”. Külön öröm számunkra, hogy az Európai Reumaliga (EULAR) új elnöke, Maurizio Cutolo professzor is megtisztel bennünket előadásával, Kassáról pedig Zelmira Macejova docens asszony, barátunk, látogat meg bennünket.

Szó lesz az autoimmun betegségek és az immunszuppresszív kezelés következtében kialakuló tuberculosis és más infekciók pathológiai, diagnosztikai és terápiás aspektusairól, az alveolitisekről, pulmonalis fibrosisoról, pulmonalis hypertensioról, az autoimmun-gyulladásos kórképek pulmonológiai manifesztációiról, az ezen kórképekben kialakuló szekunder tumorok sajátosságairól. Az anyagcsere-betegségek közül az akcelerált atherosclerosis és a lipidanyagcsere immunológiai és metabolikus összefüggéseit, a dyslipidaemiák jelentőségét, a köszvény újabb irányvonalait, a diabetes, ochronosis és egyéb anyagcsere-betegségek mozgásszervi vonatkozásait tárgyaljuk majd. Külön figyelmet kapnak a metabolikus csontbetegségek, így az osteoporosis, osteomalacia, hyperparathyreosis és Paget-kór is. Az endokrinológiai témakörben pedig a pajzsmirigy, mellékpajzsmirigy, mellékvese, hypophysis betegségeinek reumatológiai aspektusait, a szteroidkezeléssel kapcsolatos újabb ismereteket és még sok más delikát témát tekintünk át.

Az előző DROP-hoz hasonlóan, az orvosi programmal karöltve, egy színvonalas szakdolgozói programot is összeállítottunk, mely szintén a fenti témákban, de szakdolgozói szempontból, gyakorlati oldalról közelíti meg a kérdésköröket.

A két estén pedig, a szakmai programtól megfáradva, színes kulturális-társasági programokon pihenhetik ki magukat. A szakmai együttlét és az esti közös feltöltődés bőven alkalmat ad majd a kapcsolatok ápolására, a szakmapolitikai kérdések megvitatására, a barátságok születésére.

Ennek reményében köszöntjük kedves vendégeinket a DROP5-ön!

Debrecen, 2014. február 13.

Prof. Dr. Szekanecz Zoltán
a kongresszus elnöke

A FÓRUM IDŐPONTJA:

2014. február 13-15.

A FÓRUM HELYSZÍNE:

Kölcsey Központ, 4026 Debrecen, Hunyadi u. 1-3.

A FÓRUM VÉDNÖKEI:

Kósa Lajos

Debrecen megyei jogú város polgármestere

Prof. Dr. Szilvássy Zoltán
a Debreceni Egyetem rektora

Prof. Dr. Mátyus László
a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar dékánja

Prof. Dr. Édes István
a Debreceni Egyetem Klinikai Központ főigazgatója

FŐSZERVEZŐ:

Prof. Dr. Szekanecz Zoltán

A SZAKDOLGOZÓI TUDOMÁNYOS PROGRAM FŐSZERVEZŐJE:

Domján Andrea

TUDOMÁNYOS ÉS SZERVEZŐBIZOTTSÁG

A TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG VEZETŐJE

Prof. Dr. Szekanecz Zoltán

A TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG TAGJAI:

Dr. Brugós László

Domján Andrea

Prof. Dr. Nagy Endre

Prof. Dr. Paragh György

Dr. Szántó Sándor

Prof. Dr. Szilasi Mária

Dr. Szűcs Gabriella

RÖVIDÍTETT ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS Humira 40 mg oldatos injekció előretöltött fecskendőben (EU/1/03/256/003)

ATC-kód: L04AB04 **Mínőség és mennyiség összetétel:** 40 mg adalimumab előretöltött fecskendőben. **Terápiás javallatok.** 1. **Rheumatoid arthritis:** Metotrexáttal együtt adagolva javallott: Középsúlyos, illetve súlyos aktív rheumatoid arthritisben szenvedő betegek kezelésére, ha a betegségét befolyásoló reumaelemes szerek (disease-modifying antirheumatic drugs), beleértve a metotrexátot, nem hatásosak. Súlyos, aktív és progresszív rheumatoid arthritis betegségben szenvedő felnőttek kezelésére, akiket előzőleg még nem kezeltek metotrexáttal. A Humira metotrexát-intolerancia esetén, vagy ha a folyamatos metotrexát-kezelés nem megfelelő, monoterápiának is alkalmazható. A Humira csökkenti a röntgen felvétellel kimutatható ízületi károsodás progressziójának mértékét és javítja a fizikai funkciókat, ha metotrexáttal kombinálva kerül alkalmazásra. 2. **Polyarthriticus juvenilis idiopathiás arthritis:** A Humira metotrexáttal kombinálva a polyarthriticus juvenilis idiopathiás arthritis kezelésére javallott olyan 2-<4 éves gyermeknél és serdülőknél, akik nem reagáltak megfelelően egy vagy több, betegségét befolyásoló reumaelemes szerek (disease-modifying antirheumatic drug, DMARDs). 3. **Arthritis psoriatica:** Humira javallott felnőttkori aktív és progresszív arthritis psoriatica kezelésére, ha a betegségét befolyásoló reumaelemes szerek (disease-modifying antirheumatic drugs) használata nem járt terápiás sikerrel. A Humira röntgenfelvételekkel igazoltan csökkenti a perifériás ízületi károsodások progressziós rátáját a betegség sokizületi szimmetrikus altípusában szenvedő betegek körében, valamint, javítja a fizikális funkcióit. 4. **Axisialis spondyloarthritis:** Spondylitis ankylopoetica (SPA): Humira felnőttkori súlyos aktív spondylitis ankylopoetica kezelésére javallott, ha a beteg nem reagál megfelelően a hagyományos kezelésre. Spondylitis ankylopoeticának (SPA) megfelelő röntgenelvértéssel nem járó axisialis spondyloarthritis: A Humira-kezelés indikált az olyan, felnőttkori súlyos axisialis spondyloarthritisben szenvedő betegeknek, akiknél az SPA-nak megfelelő röntgenelvértéssel nem mutatható ki, de a gyulladás objektív jelei emelkedett CRP-vel és/vagy MRI vizsgálattal igazolhatók, és akik nem reagáltak megfelelően a nem szteroid gyulladáscsökkentő gyógyszerekre vagy nem tolerálták azokat. 5. **Crohn-betegség:** A Humira középsúlyos és súlyos aktivitású Crohn-betegség kezelésére javallott olyan felnőtt betegeknek, akik nem reagáltak a kortikoszteroidok és/vagy immunosuppresszív szerrel végzett teljes és adekvát kúrára, vagy akik nem tolerálják ezeket a szereket, vagy akiknél e szerek alkalmazása orvosi szempontból ellenjavallt. 6. **Gyermekekre Crohn-betegség:** A Humira súlyos aktivitású Crohn-betegség kezelésére javallott olyan gyermekeknek (6-17 éveseknél), akik nem reagáltak megfelelően a hagyományos kezelésre, beleértve a primer étrendi kezelést, egy kortikoszteroidot és egy immunmodulánst, vagy akik nem tolerálták ezeket a szereket, illetve akiknél ezek a kezelések kontraindikáltak. 7. **Colitis ulcerosa:** A Humira felnőttkori, középsúlyos-súlyos, aktív colitis ulcerosa kezelésére javallott olyan betegeknek, akik a hagyományos kezelésre, köztük kortikoszteroidra és 6-merkaptopurinra (6-MP) vagy azathioprinre (AZA) nem mutattak megfelelő terápiás választ, vagy nem tolerálják ezeket a kezeléseket, illetve orvosi szempontból ellenjavallt ezen gyógyszerek adása. 8. **Psoriasis:** A Humira javallott olyan felnőtt betegek közepesen súlyos, illetve súlyos krónikus, plakkos psoriasisának kezelésére, akik más szisztémás kezelésekre, köztük a ciklosporinra, a metotrexátra vagy a PUVA-ra nem reagáltak, vagy esetükben e kezelési módok ellenjavallottak, illetve nem tolerálják azokat. **Adagolás és alkalmazás:** 1. **Rheumatoid arthritis:** felnőttek esetében 40 mg adalimumab, kéthetente egy alkalommal egy adagban subcutan injekció formájában. A metotrexát folytatása javasolt a Humira-val való kezelés ideje alatt. Monoterápiában hatásosodás esetén a dózis hetenkénti 40 mg-ra emelhető. 2. **Polyarthriticus juvenilis idiopathiás arthritis:** 2-12 éves korig 24 mg/25testszínm², kéthetente, legfeljebb egyszer adott 20 mg adalimumab (2-<4 éves betegek esetén) és kéthetente legfeljebb egyszer adott 40 mg adalimumab (4-12 éves betegek esetén) subcutan injekció formájában; a 13-17 éves serdülők adagja a testsúlyszintől függetlenül minden második héten 40 mg. 3. **Arthritis psoriatica** vagy 4. **Axisialis spondyloarthritis:** 40 mg adalimumab kéthetente egy alkalommal subcutan injekcióban. 5. **Középsúlyos-súlyos Crohn-betegség:** felnőttek indukciós kezelésére 80 mg a 0. héten, majd 40 mg a 2. héten. A terápiás hatás gyorsabb eléréséhez a készítmény alkalmazható a 0. héten 160 mg, a 2. héten 80 mg dózissal a mellékhatások nagyobb kockázatával. Fenntartó kezelés: javasolt adag 40 mg minden második héten, subcutan injekcióban. Hatásosodás esetén a dózis hetenkénti 40 mg-ra emelhető. 5. **Gyermekekre Crohn-betegség, 40 kg alatti betegek:** indukciós kezelés: a 0. héten 40 mg, amit a 2. héten 20 mg követ. A terápiás hatás gyorsabb eléréséhez a 0. héten 80 mg, a 2. héten 40 mg is alkalmazható a mellékhatások nagyobb kockázatával. Fenntartó kezelés: javasolt dózis minden második héten 20 mg subcután adott injekció. Nem megfelelően reagáló betegnél a dózis heti 40 mg-ra emelhető. 6. **Gyermekekre Crohn-betegség, legalább 40 kg-os betegek:** indukciós kezelés: a 0. héten 80 mg, amit a 2. héten 40 mg követ. A terápiás hatás gyorsabb eléréséhez a 0. héten 160 mg, a 2. héten 80 mg is alkalmazható a mellékhatások nagyobb kockázatával. Fenntartó kezelés: javasolt dózis minden második héten 40 mg subcután adott injekció. Nem megfelelően reagáló betegnél a dózis heti 40 mg-ra emelhető. 7. **Középsúlyos-súlyos colitis ulcerosa:** felnőttek indukciós kezelésére 160 mg a 0. héten, majd 80 mg a 2. héten. Az indukciós kezelést követően a javasolt adag 40 mg minden második héten, subcutan injekcióban. Ha csökken a terápiás hatás, a dózis heti 40 mg-ra emelhető. 8. **Psoriasis:** felnőttek betegnél kezdő dózis 40 mg subcután, melyet egy hét múlva kéthetente 40 mg-os dózissal követnek subcután. **Speciális esetek:** Idős betegeknél az adagolás megváltoztatásának nem szükséges. Csökkent vese- illetve májműködés esetén nem állnak rendelkezésre adatok, így dózisa javaslat nem tehető. **Ellenjavallatok:** a készítmény hatányanyagával vagy bármely segédanyagával szembeni túlérzékenység. Aktív tuberkulózis vagy más súlyos fertőzés, mint sepszis vagy opportunista fertőzések. Középsúlyos, súlyos szívelégtelenség (NYHA III/IV). **Mellékhatások:** A leggyakoribb mellékhatások a fertőzések (pl. nasopharyngitis, felső légúti fertőzés és sinusitis), az injekció beadási helyén jelentkező reakciók (erythema, pruritus, suffulgo, fájdalom vagy duzzanat), a fejfájás és a mozgásszervi eredetű fájdalom. Súlyos mellékhatásokról is beszámoltak a Humira alkalmazása során. A TNF-antagonisták, így a Humira is befolyásolja az immunrendszert, és alkalmazásuk megváltoztathatja a szervezet fertőzőkkel és daganatokkal szembeni védekezőképességét. A Humira alkalmazása során beszámoltak fatális és életveszélyes fertőzősekre (beleértve a sepsist, az opportunista fertőzéseket és a TBC-t), a HBV reaktiválódásról és különböző malignus betegségekről is (beleértve a leukémiát, a lymphomát és hepatocellularis T-sejtes lymphomát). Súlyos haematológiai, neurológiai és autoimmun folyamatokról is beszámoltak, mint pl. pancytopenia, aplaszticus anaemia, központi és perifériás demyelinizációs betegségek néhány esete, lupus erythematosus, lupus-sal összefüggő betegségek és Stevens-Johnson szindróma. **Nagyon gyakori mellékhatások:** légúti fertőzések, leukopenia, anaemia, emelkedett lipidszint, fejfájás, hasi fájdalom, hányinger, hányás, emelkedett májenzimszintek, bőrkültes (beleértve az exfoliatív bőrkültest is), mozgásszervi eredetű fájdalom, az injekció beadási helyén jelentkező reakció. **Gyakori mellékhatások:** szisztémás fertőzések (beleértve a sepsist, candidiasist és az influenza), bőrfertőzések (beleértve a vírusos gastroenteritist is), bőr- és légúrszertőzések (beleértve a paronychiát, cellulitist, impetigót, necrotizáló fasciitist és a herpes zostert is), fülfertőzések, orális fertőzések (beleértve a herpes simplexet, orális herpeszt és a fertőzőseket is), a nem szerves fertőzések (beleértve a vulvovaginalis mycoticus fertőzéseket is), hüvelyi fertőzések (beleértve a pylonephritist is), gombás fertőzések, ízületi fertőzések, bőrrák, kivéve a melanomát (beleértve a basalisztes carcinomát és a planocellularis carcinomát is), jóindulatú daganat, leukocytosis, thrombocytopenia, hypersensitivitás, allergiák (beleértve a szezonális allergiát is), hypokalaemia, emelkedett húgysavszint, kóros nátriumszint a vérben, hypocalcaemia, hyperglykaemia, hypophosphataemia, dehidráció, hangulatváltozás (beleértve a depressziót is), szorongás, insomia, paraesthesia (beleértve a hypaesthesia-t is), migraine, látásromlás, conjunctivitis, blepharitis, szem környéki duzzanat, vertigo, Tachycardia, hypertensio, kipirulás, haematoma, asthma, dyspnoe, köhögés, gastrointestinalis vérzés, dyspepsia, gastrooesophagealis reflux betegség, sicca-szindróma, súlyosbódó, illetve újonnan kialakuló psoriasis (beleértve a palmoplantaris pustulosus psoriasist), urticaria, suffusio (beleértve a purpurát is), dermatitis (beleértve az eczémát is), onychoclasia, hyperhidrosis, alopecia, pruritus, izomspasmus (beleértve a kreatinin-foszfokináz-szint emelkedését is a vérben), beszűkült vesefunkció, haematuria, melkasi fájdalom, oedema, láz, vérárvadási zavar vagy vérzékenység (beleértve az aktivált parciális thromboplastin-ido megnyúlását is), az autoantitest vizsgálat pozitívvá válása (beleértve a kettős szállú DNS-ellenes antitestet is), a vér laktát-dehidrogenáz-szintjének emelkedése, halláskárosodás.

Termékenységi, terhesség és szoptatás: az adalimumab alkalmazása nem javasolt terhességben. Fogamzásképes nők esetében fokozottan ajánlott a fogamzásgátlás a Humira-kezelés alatt, illetve az utolsó kezelést követő 6 hónapban. Kitételül arra, hogy a humán immunoglobulinok kiválasztódnak az anyatejbe, az utolsó Humira kezelést követően legalább 6 hónapig kizárható szoptatni nem szabad.

Bővebb információért olvassa el a gyógyszer alkalmazási előírását! Alkalmazási előírás dátuma: 2013.09.19. **Forgalomba hozatali engedély jogosultja:** AbbVie Ltd., Maidenhead, SL6 4XE, Nagy-Britannia. **Forgalomba hozatali engedély jogosultjának helyi képviselője:** AbbVie Kft. Budapest Lechner Ödön fasor 7. Telefonszám: +36 (1) 455-8600. **Kiadathatóság:** Korlátozott értekezési orvosi rendelvényhez kötött, szakorvos/kórközi diagnózist követően folyamatos szakorvosi ellenőrzés mellett alkalmazható gyógyszer (Sz). A közfinanszírozás alapjául elfogadott ár: 275 090 Ft. Rendszerező: O. Ft. Tértési díj: 275 090 Ft. Támogatott indikációk: - Forrás: www.oep.hu. Letöltés: 2014.01.22. Az aktuális árak megtalálhatók a www.oep.hu oldalon. A Humira 2012. február 1-től tételes finanszírozás keretében érhető el (OENO 0652, kompetencia 8.,9.,10.,11.) Finanszírozott indikációs kör: Rheumatoid arthritis, Spondylitis ankylopoetica, Arthritis psoriatica, Polyarthriticus juvenilis idiopathiás arthritis; Crohn-betegség, Colitis ulcerosa, Psoriasis. A 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet alapján, Magyar Közlöny, 2013. évi 16. szám (Az emberi erőforrások minisztere 9/2013. (I. 31.) EMMI rendelete egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról).

Hivatkozások: 1. Keystone EC, et al. Clinical, Functional, and Radiographic Benefits of Long-term Adalimumab Plus Methotrexate: Final 10-year Data in Longstanding Rheumatoid Arthritis. *J Rheumatol*. 2013 Sep;40(9):1487-97. 2. Keystone EC, et al. Long term Effect of Delaying Combination Therapy with Tumor Necrosis Factor Inhibitor in Patients with Aggressive Early Rheumatoid Arthritis: 10-year Efficacy and Safety of Adalimumab from the Randomized Controlled PREMIER Trial with Open-label Extension. *J Rheumatol* 2013 Nov 15 [Elektronikus közlés, nyomtatás előtt]. 3. Burmester GR et al. Adalimumab: long-term safety in 23 458 patients from global clinical trials in rheumatoid arthritis, juvenile idiopathic arthritis, ankylosing spondylitis, psoriatic arthritis, psoriasis and Crohn's disease. *Ann Rheum Dis*. 2013 Apr;72(4):517-24.

HUMIRA

A tudomány
erejével



A Humira erejével hatalmában áll változtatni

A Humira+MTX kombinációs kezelés
ízület- és porcvédő hatása 10 éven keresztül
igazolt mind korai, mind régóta fennálló
rheumatoid arthritisben^{1,2}

HUMIRA
adalimumab

BIZONYÍTOTTAN MEGBÍZHATÓ³

ÁTTEKINTŐ PROGRAM, DROP 5

2014. FEBRUÁR 13., CSÜTÖRTÖK
KÖLCSEY KÖZPONT NAGYTEREM

09:50–10:00	Bevezetés	Szekanecz Zoltán
10:00–12:00	State-of-the-art	Paragh György, Nagy Endre, Szilasi Mária, Soltész Pál, Lakatos Péter
12:00–12:30	Kávészünet	
12:30–13:40	Tüdőgyógyászat I. - Tuberculosis	Kónya József, Müller Veronika, Brugós László, Csontos Zoltán
13:40–15:00	Ebédszünet	
15:00–16:45	Tüdőgyógyászat II. - Gyulladások és tumorok	Dankó Katalin, Szűcs Gabriella, Végh Judit, Actelion, Horváth Zsolt, Szekanecz Éva, Fodor Andrea
16:45–17:15	Kávészünet	
17:15–17:45	Plenáris előadás	Maurizio Cutolo
17:45–19:00	Tüdőgyógyászat III. - Autoimmun kórképek	Surányi Péter, Géher Pál, Zeher Margit, Kiss Emese, Horváth Ágnes
19:00–20:00	Ünnepélyes megnyitó, köszöntők	
20:00–	Fogadás	

2014. FEBRUÁR 14., PÉNTEK

KÖLCSEY KÖZPONT NAGYTEREM

09:00–10:15	Anyagcsere- Endokrinológia I. Köszvény és más kristálybetegségek	Poór Gyula, Tamási László, Balogh Zoltán, Varju Tibor
10:15–11:00	Szponzorált előadások	Berlin-Chemie, Sager Pharma
11:00–11:30	Kávészünet	
11:30–12:55	Anyagcsere- Endokrinológia II. Atherosclerosis és metabolikus szindróma	Fülöp Péter, Seres Ildikó, Kerekes György, Bálint Géza, Nagy Gergely
12:55–13:55	Szponzorált előadások	AbbVie, Roche, Egis Biologicals
13:55–15:00	Ebédészünet	
15:00–16:10	Szponzorált előadások	MSD, Aramis Pharma, UCB
16:10–16:45	Kávészünet	
16:45–18:00	Anyagcsere- Endokrinológia III. A csontok metabolikus és daganatos betegségei	Szekeres László, Szántó Sándor, Gaál János, Kocsis Judit, Gulyás Katalin
18:00–18:20	Szponzorált előadások	Lilly, Amgen
20:00–	Esti program	



ÁTTEKINTŐ PROGRAM, DROP 5

2014. FEBRUÁR 15., SZOMBAT
KÖLCSEY KÖZPONT NAGYTEREM

09:00–10:15	Anyagcsere- Endokrinológia IV. Endokrin kórképek	Erdei Annamária, Zelmira Macejova, Katona Éva, Jakab Attila, Ilonczai Péter
10:15–10:45	Kávészünet	
10:45–11:35	Szponzorált előadások	MSD, Pfizer
11:35–13:05	Anyagcsere- Endokrinológia V. Varia, ritka betegségek	Káplár Miklós, Sira Livia, Pfliegler György, Harangi Mariann, Kovács Attila
13:05–14:15	Ebédészünet	
14:15–15:30	Terápia-prevenció	Kovács László, Bodolay Edit, Hodinka László, Kerekes György, Hegyi Péter
15:30–16:00	Kávészünet	
16:00–17:00	Terápia-prevenció (folytatás)	Rákóczi Éva, Nagy Katalin, Bodor Miklós, Szamosi Szilvia
17:00–	Tesztírás, a kongresszus zárása	

02P5

SZAKDOLGOZÓI SZEKCIÓ

2014. FEBRUÁR 14., PÉNTEK

KÖLCSEY KÖZPONT FÖLDSZINTI SZEKCIÓ TEREM

09:30–09:40	Megnyitó, Köszöntések	
09:40–10:55	Tudományos előadások a tüdőgyógyászat témaköréből	Szabó Irén, Brugós László, Aszalós Tiborné, Szecsódi Szilvia, Szabóné Domokos Mariann, Gálné Szilágyi Lilla, Bereczki Tímea
10:55–11:15	Kávészünet	
11:15–12:50	Tudományos előadások az anyagszere betegségek témaköréből	Kovács Attila, Kulcsár Gyöngyi, Szekeres László, Szántó Sándor, Piukovics Katalin, Marcsik Ákos Ferenc, Török Diána, Sárosiné Hóh Henriette, Koszna Lilla
12:50–13:30	Ebédszünet	
13:30–14:45	Tudományos előadások a reumatológiai szakellátás újdonságairól	Domján Andrea, Csarnainé Pálosi Rita, Gáti Tamás
14:45–14:55	Technikai szünet	
14:55–15:05	Tesztírás	
15:05	A tudományos program zárása	

[illegible]

PROGRAM**2014. FEBRUÁR 13., CSÜTÖRTÖK****09:50 Bevezetés**

Szekanecz Zoltán, Debrecen

10:00 State-of-the-art referátumok

Üléselnökök: Paragh György, Soltész Pál

10:00 Lipidanyagcsere és HDL paradoxon gyulladásos reumatológiai kórképekben

Paragh György, Debrecen

10:20 Immuno-endokrinologia

Nagy Endre, Debrecen

10:40 Tüdőtumorok és reumatológiai betegségek

Szilasi Mária, Debrecen

11:00 Az akcelerált atherosclerosis immunológiai vonatkozásai

Soltész Pál, Debrecen

11:20 Osteoimmunologia

Lakatos Péter, Budapest

11:40 Megbeszélés**12:00 Kávészünet****12:30 Tüdőgyógyászat I. - Tuberculosis**

Üléselnökök: Szilasi Mária, Kónya József

12:30 A tuberculosis laboratóriumi diagnosztikája

Kónya József, Debrecen

12:45 A tuberculosis modern diagnosztikai irányelvei

Müller Veronika, Budapest

13:00 Tuberculosis biológiai terápia mellett

Brugós László, Debrecen

13:15 A tuberculosis kezelése

Csontos Zoltán, Debrecen

13:30 Megbeszélés

13:40 Ebédszünet

15:00 Tüdőgyógyászat II. – Gyulladások és tumorok

Üléselnökök: Dankó Katalin, Horváth Zsolt

15:00 Alveolitisek, pneumonitisek

Dankó Katalin, Debrecen

15:15 Pulmonalis fibrosis

Szűcs Gabriella, Debrecen

15:30 Pulmonalis arteriás hypertensio

Végh Judit, Debrecen

15:45 Szponzorált előadás: Actelion

16:00 Onkológiai kezelések pulmonológiai (mellék)hatásai

Horváth Zsolt, Debrecen

16:15 Paraneoplasziás mozgásszervi tünetek tüdőtumorkok esetén

Szekanecz Éva, Debrecen

16:30 Esetismertetés: Legyünk résen! Szekunder tüdőtumor egy konkrét eset kapcsán

Fodor Andrea, Debrecen

16:35 Megbeszélés

16:45 Kávészünet

17:15 Plenáris előadás

Üléselnök: Szekanecz Zoltán

Circadian rhythm and corticosteroid therapy

Maurizio Cutolo, Genova

17:45 Tüdőgyógyászat III. - Autoimmun kórképek

Üléselnökök: Zeher Margit, Géher Pál

17:45 Tüdőelváltozások és differenciáldiagnosztikájuk rheumatoid arthritisben

Surányi Péter, Debrecen

18:00 Spondylarthropathiák cardiopulmonalis manifesztációi

Géher Pál, Budapest

18:15 ANCA-asszociált vasculitisek

Zeher Margit, Debrecen

OP5

FEBRUÁR 13. • CSÜTÖRTÖK

18:30 **Szisztémás autoimmun kórképek pulmonológiai manifesztációi**
Kiss Emese, Budapest

18:45 **Esetismertetés: Alveolitis vagy tüdőtumor?**
Horváth Ágnes, Debrecen

18:50 **Megbeszélés**

19:00 Ünnepélyes megnyitó, köszöntők
Közvetlenül a tudományos program után

20:00 Fogadás



FEBRUÁR 14. • PÉNTEK

DRC

2014. FEBRUÁR 14., PÉNTEK

**09:00 Anyagcsere-Endokrinológia I.
Köszvény és más kristálybetegségek**
Üléselnökök: Poór Gyula, Tamási László

09:00 **A köszvény pathogenezisének mai koncepciója**
Poór Gyula, Budapest

09:15 **A köszvény diagnosztikája**
Tamási László, Miskolc

09:30 **A köszvény terápiája**
Balogh Zoltán, Debrecen

09:45 **Egyéb kristályarthropathiák**
Varju Tibor, Nyíregyháza

10:00 **Megbeszélés**

10:15 Szponzorált előadások

10:15 **Berlin-Chemie**

10:45 **Sager Pharma**

11:00 Kávészünet

**11:30 Anyagcsere-Endokrinológia II.
Atherosclerosis és metabolikus szindróma**
Üléselnökök: Seres Ildikó, Kerekes György

11:30 **Adipokinek és szerepük a gyulladásban**
Fülöp Péter, Debrecen

11:45 **Atherosclerosis és hsCRP: rizikófaktor vagy biomarker?**
Seres Ildikó, Debrecen

12:00 **A metabolikus paradoxon gyulladásos kórképekben**
Kerekes György, Debrecen

12:15 **Obesitas reumatológiai kórképekben**
Bálint Géza, Budapest

12:30 **Ochronosis - esetbemutatással**
Nagy Gergely, Miskolc

12:45 **Megbeszélés**

12:55 Szponzorált előadások

12:55 **AbbVie**

13:05 **Roche**

13:25 **Egis Biologicals**

13:55 Ebédszünet**15:00 Szponzorált előadások**

15:00 **MSD**

15:30 **Aramis Pharma**

15:50 **UCB**

16:10 Kávészünet**16:45 Anyagcsere-Endokrinológia III.****A csontok metabolikus és daganatos betegségei**

Üléselnökök: Szekeres László, Kocsis Judit

16:45 **Primer osteoporosisok**
Szekeres László, Budapest

17:00 **Szekunder osteoporosisok**
Szántó Sándor, Debrecen

17:15 **Egyéb metabolikus csontbetegségek**
Gaál János, Debrecen

17:30 **A csont primer és szekunder tumorai**
Kocsis Judit, Debrecen

17:45 **Esetismertetés: Spondyloarthritis diagnosztikája és kezelése:
a reumatológia és az ortopédia határterületi kérdései**
Gulyás Katalin, Szántó Sándor, Debrecen

17:50 **Megbeszélés**

18:00 Szponzorált előadások

18:00 **Lilly**

18:10 **Amgen**

18.20 A tudományos program zárása**20:00 Esti program**

2014. FEBRUÁR 15., SZOMBAT

09:00 Anyagsere-Endokrinológia IV.

Endokrin kórképek

Üléselnökök: Nagy Endre, Katona Éva

09:00 **Pajzsmirigybetegséghez társuló mozgásszervi eltérések**
Erdei Annamária, Debrecen

09:15 **Hyperprolactinaemia**
Zelmira Macejova, Kosice

09:30 **Terhesség és anyagsere**
Katona Éva, Debrecen

09:45 **A menopausa mozgásszervi vonatkozásai**
Jakab Attila, Debrecen

10:00 **Esetismertetés: Thyreotoxikus periodikus paralysis**
Ilonczai Péter, Debrecen

10:05 **Megbeszélés**

10:15 Kávészünet

10:45 Szponzorált előadások

10:45 **MSD**

11:15 **Pfizer**

11:35 Anyagsere-Endokrinológia V.

Varia, ritka betegségek

Üléselnökök: Pfliegler György, Kovács Attila

11:35 **Diabeteses mozgásszervi elváltozások, polyneuropathiák**
Káplár Miklós, Debrecen

11:50 **Polycystás ovarium syndroma**
Sira Livia, Debrecen

12:05 **Ritka pulmonológiai kórképek**
Pfliegler György, Debrecen

12:20 **Ritka anyagsere- és endokrin kórképek**
Harangi Mariann, Debrecen

12:35 **Tárolási betegségek reumatológiai vonatkozásai**
Kovács Attila, Szolnok

12:50 **Esetismertetés: Egy ritka veleszületett neurodegeneratív megbetegedés, a cerebrotendinosus xanthomatosis**
Harangi Mariann, Debrecen

12:55 **Megbeszélés**

13:05 Ebédszünet

14:15 Terápia-prevenció

Üléselnökök: Bodolay Edit, Kovács László

14:15 **Autoimmun betegségek pulmonalis manifesztációinak kezelése**
Kovács László, Szeged

14:30 **D-vitamin – a csontban és a csonton kívül**
Bodolay Edit, Debrecen

14:45 **A biológiai terápia ritkább kockázatai**
Hodinka László, Budapest

15:00 **Biológiai szerek metabolikus és vascularis hatásai**
Kerekes György, Debrecen

15:15 **A savesökkentés gyakorlati kérdései**
Hegyi Péter, Szeged

15:30 Kávészünet

16:00 Terápia-prevenció (folytatás)

16:00 **Pulmonalis fertőzések kezelése és vakcináció immunszuppresszív állapotokban**
Rákóczi Éva, Debrecen

16:15 **A barlang- és klímaterápia jelentősége légzőszervi betegségekben**
Nagy Katalin, Eger

16:30 **Klinikai vizsgálatok szabályozása – ami a reumatológusnak fontos lehet**
Bodor Miklós, Debrecen

16:45 **Esetismertetés: Biológiai terápia után kialakult polyneuropathia rheumatoid arthritisen**
Szamosi Szilvia, Debrecen

16:50 **Megbeszélés**

17:00 Tesztírás, a kongresszus zárása

SZAKDOLGOZÓI SZEKCIÓ

2014. FEBRUÁR 14., PÉNTEK

09:30 Megnyitó, Köszöntések

09:40 Tudományos előadások a tüdőgyógyászat témaköréből

Moderátor: Kissné Mona Erika

(DE KK, Tüdőgyógyászati Klinika, vezető ápoló)

09:40 **A tuberculosis infekciókontroll és ápolási vonatkozásai**
Szabó Irén, Debrecen

09:50 **Tuberculosis biológiai terápia mellett**
Dr. Brugós László, Debrecen

10:05 **Tüdőérintettség szisztémás sclerosisban**
Aszalós Tiborné, Debrecen

10:15 **Mit mutat meg és hogyan zajlik a légzésfunkciós vizsgálat?**
Szecsődi Szilvia, Debrecen

10:25 **Légzési zavarok kezelési lehetőségei a pulmonológiai fizioterápia eszközeivel aktív osztályon**
Szabóné Domokos Mariann, Gálné Szilágyi Lilla, Gyula

10:35 **Cisztás fibrózis kezelési lehetőségei a gyógytornász szemével**
Bereczki Tímea, Debrecen

10:45 **Megbeszélés**

10:55 Kávészünet

11:15 Tudományos előadások az anyagcsere betegségek témaköréből

Moderátor: Bálint Anita

(Kenézy Gyula Kórház, Reumatológiai Osztály, vezető ápoló)

11:15 **A köszvény pathogenezeze és diagnosztikája**
Dr. Kovács Attila, Szolnok

11:30 **A köszvény kezelése szakdolgozói szemmel**
Kulcsár Gyöngyi, Debrecen

11:40 **Primer osteoporosisok**
Dr. Szekeres László, Budapest

- 11:55 **Szekunder osteoporosisok**
Dr. Szántó Sándor, Debrecen
- 12:10 **Az endokrin rendszer betegségei és az osteoporosis**
Piukovics Katalin, Gyula
- 12:20 **A „Gerincegér” használatának bemutatása csonttritkulásban szenvedő betegeknél**
Marcsik Ákos Ferenc, Török Diána, Debrecen
- 12:30 **A testmozgás hatásai a cukorbetegségre**
Dr. Sárosiné Hóh Henriette, Koszna Lilla, Gyula
- 12:40 **Megbeszélés**

12:50 Ebédszünet

13:30 Tudományos előadások a reumatológiai szakellátás újdonságairól

Moderátor: Domján Andrea

(DE KK Belgyógyászati Intézet Reumatológiai Tanszék, vezető ápoló)

- 13:30 **Prekoncepció és tévhitek a biohasonló gyógyszerek terápiás szerepét és értékét illetően**
Domján Andrea, Debrecen
- 13:45 **Betegoktatás, jelen és jövő**
Csarnainé Pálosi Rita, Debrecen
- 13:55 **Táblagép használata a gyulladásos reumatológiai betegek gondozása során**
Dr. Gáti Tamás, Budapest
- 14:10 **A táblagép használatban, gyakorlati bemutató**
Dr. Gáti Tamás, Budapest
- 14:25 **MRSZE hírek**
Domján Andrea, Debrecen
- 14:35 **Megbeszélés**

14:45 Technikai szünet

14:55 Tesztírás

15:05 A tudományos program zárása

Csökkenti mind a szérum, mind a vizelet húgysavszintjét...¹



ALLOPURINOL
MILURIT® 100 mg
300 mg



Rövidített alkalmazási előírás

Milurit® 100 mg, 300 mg tabletta

ATC kód: M04AA01 **Minőség és mennyiség összetétel:** 100 mg ill. 300 mg allopurinol tablettnként. **Segédanyag:** Minden Milurit® 100 mg tabletta 50 mg laktóz-monohidrátot tartalmaz. **Gyógyszerforma:** Fehér vagy szürkésfehér színű, kerek, lapos, metszett élű tabletta, másik oldalon felezővonalal. A tabletta egyenlő adagokra osztható. **Terápiás javallatok:** Az urát-húgysav képződés csökkentésére javasolt olyan állapotokban, ahol már urát-húgysav lerakódás észlelhető (pl. köszvény, tophusok, vesék), vagy ennek veszélye előre látható (pl. malignus daganat elleni kezelések, amelyek akut húgysav-nephropathiához vezethetnek). A legfontosabb klinikai állapotok, ahol urát-húgysav lerakódás előfordulhat, a következők: idiopátiás köszvény, húgysavkövesség, akut húgysav nephropathia, magas sejtosztódási rátaú malignus daganatok, illetve myeloproliferatív betegségek, amelyekben vagy spontán, vagy citotokus kezelés után jelentkezik magas húgysavszint, bizonyos urát túltermeléshez vezető enzim-rendellenességek, mint pl. hipoxantin-guanin-foszforibozil-transferáz hiány, ideértve a Lesch-Nyhan-szindrómát, glukóz-6-foszfát hiány, ideértve a Lesch-Nyhan-szindrómát, a foszforibozil-pirifoszfát-szintetáz enzim fokozott aktivitása, a foszforibozil-pirifoszfát-amidotranszferáz fokozott aktivitása, adenin-foszforibozil-transferáz hiány. A Milurit® javasolt az adeninfoszforibozil-transferáz enzim elégtelensége következtében létrejött 2,8-dihidro-adenin (2,8-DHA) vesekövek kezelésére. A Milurit® javasolt a hyperuricaemiával járó kevert Ca-oxalát-képződés megelőzésére és kezelésére, amikor a fokozott folyadékbevitel, a diéta és hasonló intézkedések nem eredményesek. **Adagolás és alkalmazás:** Felnőtteknek Az ajánlott kezdő adag naponta egyszer 100 mg. A napi adag szükség esetén fokozatosan – a szérum húgysavszint 1-3 hetenkénti ellenőrzésével – 100 mg-orig emelhető. A kezelés beállításához javasolt séma: napi 100-200 mg javasolt az enyhe, napi 300-600 mg a mérsékelt, napi 700-900 mg a súlyos állapotokban. **Gyermekekpopuláció (15 éves kor alatt)** A készítmény javasolt napi adagja gyermekeknek 10-20 mg/kg, a napi adag nem haladhatja meg a 400 mg-ot. Gyermekekben a készítmény adása a malignus betegségeket (különösen leukemiákat), illetve enzim rendellenességeket (pl. Lesch-Nyhan-szindrómát) kivéve csak kivételesen esetekben indokolt. **Vesekárosodásban Súlyos** vesekárosodásban tandocsos lehet napi 100 mg-nál kisebb adag alkalmazása, vagy a napi egyszeri 100 mg-os dózis egy napnál hosszabb időközre történő adagolása is. **Májkárosodásban** A dózis csökkenteni kell. **Az alkalmazás módja** A Milurit® tablettát naponta egyszer, étkezés után kell bevenni. Ha a napi adag meghaladja a 300 mg-ot és gastrointestinális panaszok jelentkeznek, a napi adagot több részletre elosztva javasolt adagolni. **Ellenjavallatok:** A készítmény hatóanyagával, vagy bármely segédanyagával szembeni túlérzékenység. **Gyógyszerköcsönhatások és egyéb interakciók:** 6-merkaptopurin, azatioprin, vidarabin, szalicilátok és uricosaurik szerek, klorpromamid, klorpromamid stb. **Terhesség és szoptatás:** A Milurit® tablettát terhességben nem szabad alkalmazni, csak akkor, ha nincs biztonságosabb kezelési lehetőség és a betegség nagyobb veszélyt jelent az anyára és a magzatra nézve. Szoptatás alatt alkalmazása nem javasolt. **Nemkívánatos hatások, mellékhatások:** Az allopurinollal összefüggő nemkívánatos hatások a teljes kezelési populációban ritkán fordulnak elő, és leggyakrabban nem súlyosak. Gyakoriságuk nagyobb vese- és/vagy májkárosodásban. **Nagyon ritka (<1/10000):** thrombocytopenia, agranulocytosis, aplasztikus anaemia, thrombocytopenia. Ezeket a mellékhatásokat nagyon ritkán jelentetik, különösen vese- és májkárosodásban szenvedő betegekben fordulnak elő. **Ritka (<1/10000 – <1/1000):** hepatitis, súlyos bőre reakciók (pl. Stevens-Johnson szindróma). **Nem gyakori (<1/1000 – <1/100):** túlérzékenységi reakciók, hányás, hányinger. **Gyakori:** bőrkörbítés A bőre reakciók a leggyakoribb mellékhatások, a kezelés folyamán bármikor előfordulhatnak. Bőre körbítés észlelésekor a kezelést azonnal fel kell függeszteni. Ha a bőrtünetek enyhék voltak, megszűnésük után az allopurinol újra adható csökkentett adagban (pl. 50 mg/nap), amelyet fokozatosan lehet emelni. **Felhasználhatósági időtartam:** 5 év. **Előgyógyez:** ++ (kétkezes, erős hatású), Osztaláz II. csoport. Kizárólag orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer (V). **Forgalomba hozatali engedély száma:** OGYI-7431/01 (100 mg), OGYI-7404/01 (300 mg). **Alkalmazási előírás OGYI engedély száma:** OGYI/46068/2012, OGYI/46071/2012. **A forgalomba hozatali engedély kiadásának/megújításának dátuma:** 1972.01.01./2009.04.10 (100 mg); 1994.01.01./2009.04.10 (300 mg). **Szöveg ellenőrzésének dátuma:** 2013.06.14. **A forgalomba hozatali engedély jogosultja:** Egis Gyógyszergyár Nyrt., H-1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.

Bővebb információért olvassa el a gyógyszer alkalmazási előírását!

Árinformáció:

Milurit® 100 mg 50x foyasztói ár: 711 Ft, TB támogatás: 569 Ft, térítési díj: 142 Ft

Milurit® 300 mg 30x foyasztói ár: 827 Ft, TB támogatás: 662 Ft, térítési díj: 165 Ft

Termékeink árvaltozásával és rendelkezésével kapcsolatos információkért forduljon orvosától kollégáinkhoz, illetve ezekről tájékozódhat az Országos Egészségbiztosítási Pénztár honlapján: www.oeo.hu.

További információ: Egis Gyógyszergyár Nyrt. marketingfőosztály, 1134 Budapest, Lelöl út 15.

tel: 803-22-22, fax: 803-24-59, e-mail: marketing@egis.hu, honlap: www.egis.hu

Lezárs dátuma: 2014.02.03

TÁMOGATÓK, KIÁLLÍTÓK



Ezüst szponzor



Ezüst szponzor



BERLIN-CHEMIE
MENARINI

Bronz szponzor



Bronz szponzor



RICHTER GEDEON

Bronz szponzor



Bronz szponzor

abbvie

Actelion Pharmaceuticals Hungaria Kft.

Amgen Gyógyszerkereskedelmi Kft.

Aramis Pharma Kft.

Lilly Hungária Kft.

MSD Pharma Hungary Kft.

Pharma Nord Kft.

Sager Pharma Kft.

Sandoz Hungária Kft.

TEVA Gyógyszergyár Zrt.

A Kongresszus szervezői köszönetüket fejezik ki a kiállító, hirdető cégek és a szponzorok által nyújtott támogatásért!

DR

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK

AZ INTERDISZCIPLINÁRIS FÓRUM HELYSZÍNE

Kölcsey Központ, 4026 Debrecen, Hunyadi u. 1-3.

HELYSZÍNI REGISZTRÁCIÓS IRODA NYITVATARTÁSA

Február 13-án, csütörtökön: 08.00 - 19.00

Február 14-én, pénteken: 08.00 - 18.30

Február 15-én, szombaton: 08.00 - 17.30

A regisztrációs iroda telefonszáma: 06/30-985-4191

(csak február 12-13-14-15-én hívható!)

RÉSZVÉTELI DÍJAK A HELYSZÍNE

Normál regisztráció	43 200 Ft (34 016 Ft+ÁFA)
Nyugdíjasok, szakorvosjelöltek, rezidensek jelöltek, rezidensek	35 600 Ft (28 031 Ft+ÁFA)
PhD hallgatók, szakdolgozók, kísérők	33 000 Ft (25 984 Ft+ÁFA)
Cégek képviselői	33 000 Ft (25 984 Ft+ÁFA)
Napijegy	19 000 Ft (14 961 Ft+ÁFA)
Szakdolgozói szekción való részvétel	7 000 Ft (5 512 Ft+ÁFA)

A regisztrált résztvevők részvételi díja tartalmazza:

- Résztvételt a szakmai programon
- Az akkreditációs pontokat
- A kiállítás megtekintésének jogát
- Programfüzetet
- Kongresszusi táskát, jegyzetfüzetet, tollat
- Kávészüneteket 3 napra
- A február 13-i Nyitófogadást
- A február 14-i Vacsoraestet

Kísérői regisztráció tartalmazza:

- A kiállítás megtekintésének jogát
- Egy belépőjegyet az Aquaticum Élményfürdőbe
- A február 13-i Nyitófogadást

Céges regisztráció tartalmazza:

- Résztvételt a szakmai programon
- Programfüzetet
- Kávészüneteket 3 napra
- A február 13-i Nyitófogadást

DROP5

Napijegy tartalmazza:

- Részvételt az adott napi szakmai programon
- Időarányosan a kreditpontokat
- Kiállítás megtekintésének jogát

Szakdolgozói szekción való részvétel tartalmazza:

- Részvételt a február 14-i szakdolgozói szekción
- Az akkreditációs pontokat
- A kiállítás megtekintésének jogát
- Programfüzetet
- Kongresszusi táskát, jegyzetfüzetet, tollat
- A február 14-i kávészüneteket
- A február 14-i ebédet

ELŐADÁSOK

Kérjük az előadókat, hogy a számítógépes anyagok előkészítését időben végezzék el és a szekciók kezdete előtt legalább 1 órával adják le azokat a megadott helyen. Az előadások időtartamát az előadások címe után feltüntettük. A szoros időbeosztás miatt kérjük a rendelkezésre álló idő pontos betartását!

NÉVKITŰZŐ

A kongresszus ideje alatt kérjük a névkitűző használatát a helyszínrre történő belépéshez.

AKKREDITÁCIÓ

Akongresszusreumatológus, klinikai immunológus és allergológus, tüdőgyógyász, belgyógyász szakorvosok, fizioterapeuták és háziorvosok számára szabadon választható továbbképző rendezvény, kódja: DEOEC/2014.I./00148.

Tesztírás kötelező, 50 kreditpontról adunk igazolást.

A DROP5-öt PhD hallgatók számára is akkreditáltuk, a teljes programon való részvételért 1 kreditpontot írunk jóvá.

A kongresszus szakdolgozók számára is hivatalos, pontszerző szabadon választható továbbképző rendezvény. Az akkreditálás és a kreditpontok értékének meghatározása folyamatban van.

Kérjük, hogy a regisztráció alkalmával a jelenléti ívet mindenki írja alá, ill. adja meg nyilvántartási számát, mert ez a részvétel elismerésének feltétele!

FORUM

TÁRSASÁGI PROGRAMOK, ÉTKEZÉSEK

FOGADÁS

2014. február 13. (csütörtök) 20:00 óra, a Kölcsey Központ Báltermében

Díját a részvételi díj tartalmazza. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a fogadásra közvetlenül a tudományos program zárása után kerül sor, így nem lesz idejük visszatérni szállodai szobáikba.

VACSORAEST

2014. február 14. (péntek) 20:00 óra, a Kölcsey Központ Nagytermében

A Vacsoraest csak belépőjeggyel látogatható.

Helyszíni megrendelés esetén díja: 11 500 Ft (9 055 Ft+ÁFA)

EBÉD

Február 13-14-15-én a kongresszus helyszínén, a Hotel Lycium Éttermében.

Díja: 4 000 Ft/ebéd (3 150 Ft + ÁFA)

KÁVÉSZÜNETI BÜFÉ

A kávé- és ital jegyek beválthatóak a Kongresszusi büfében, a Kölcsey Kávézóban és a Lycium Drinkbárban, valamint az ebédek időtartama alatt az étteremben. A büféjegyek a következő italokra válthatóak be: kávé, üdítő és tea.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy Ave ásványvizet jegy nélkül fogyaszthatnak igény szerint a Fórum teljes ideje alatt.

SZÁLLODAI ELHELYEZÉS

Az előre megrendelt szállodai szobákat a résztvevő(k) nevére lefoglaltuk, azok a megküldött visszaigazolás szerint vehetők igénybe, általában az érkezés napján 14 órától az elutazás napján 10 óráig. Korábbi érkezés vagy későbbi elutazás esetén a csomagok elhelyezésében a szállodai porták nyújtanak segítséget.

SZÁLLÁSHELYEK

Aquaticum Termál és Wellness Hotel****
4032 Debrecen, Nagyerdei park 1.
www.aquaticum.hu

Hotel Divinus*****
4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 1.
www.hoteldivinus.hu

Centrum Hotel***
4026 Debrecen, Kálvin tér 4-8.
www.centrumhotel.hu

Hotel Lycium****
4026 Debrecen, Hunyadi u. 1-3.
www.hotellycium.hu

Hotel Nagyerdő ***
4032 Debrecen, Pallagi út 5.

Debreceni Postás Üdülő
4032 Debrecen, Nagyerdei körút 66.
www.postasudulo.5mp.eu

Hotel Óbester****
4026 Debrecen, Péterfia u. 49.
www.hotelobester.hu

Sport Hotel ***
4032 Debrecen, Oláh Gábor u. 5.
www.dbsporthotel.hu

Hotel Platán****
4030 Debrecen, Somlyai u. 10.
www.platanhotel.eu

Villa Hotel****
4032 Debrecen, Medgyessy sétány 4.
www.villahotel.hu

PARKOLÁS A HELYSZÍZEN

A Kölcsey Központ alatt található mélygarázsban a DKV Zrt. díjszabása érvényes (280 Ft/óra/szgek.).

Érkezéskor a jegykiadó készüléken nyomja meg a jegykiadó gombot, ekkor a készülék kiadja a parkolókarttyát. A kártyát tartsa magánál, mert nélküle nem tudja kifizetni a parkolás díját és elhagyni a parkolóházat. Figyelem! Minden behajtás díjköteles. Parkolási díjat a mélygarázsban elhelyezett díjfizető-automatánál tudja befizetni! A parkolási díj kifizetése után 15 perc áll rendelkezésére a parkolóház elhagyására.

A kijárat sorompó előtt elhelyezett kártyaolvasó készülékbe helyezze be a parkolókarttyáját, hogy a készülék ellenőrizze azt. A sorompó felnyílása és a zöld jelzőlámpa kigyulladás után elhagyhatja a parkolóházat.

A **Lycium Hotelben** megszálló vendégek a szabad kapacitás függvényében a Központ mélygarázsában, a szálloda részére elkülönített, külön sorompójával ellátott 50 db belső fedett parkoló használata biztosított, ára: 2.500.-Ft/szgek./éj (amennyiben ezek a helyek megteltek, további parkolóhelyek is biztosítottak a mélygarázsban ezen az áron).

A külső parkoló igénybevételi időtartama: érkezés napján 13:30 - utazás napján 10:30-ig. Az ettől korábbi/későbbi érkezés/távozás plusz díjat von maga után: 280 Ft/óra/szgek.

Bethlen utcai parkolás: A Kölcsey Központ főbejáratával szembeni üres telken is van lehetőség parkolásra, ennek díja: 280.-Ft/óra/szgek., illetve 1.300.-Ft/nap/szgek.

PARKOLÁS DEBRECENBEN

Parkolójegy váltása a parkoló-automatáknál lehetséges. Debrecenben a parkolási díj övezettől függően 180 – 340 és 440 Ft/óra. További információk kérhetők a DKV Ügyfélszolgálatán (<http://dkv.hu>). Díjfizetés a fizető automata vagy mobiltelefon segítségével is történhet.

JAVASOLT TAXI TÁRSASÁG

Főnix Taxi, 24 órás taxi szolgálat, telefon: 52/444-444, 20/3-444-444, 30/9-444-444, 70/2-444-555. A kitűző felmutatásával és a DROP kongresszusra való hivatkozással, kedvezményesen (3. díjtartifa) lehet igénybe venni a Főnix Taxi szolgáltatásait. Bejelentkezéskor is kérjük jelezni, hogy a DROP Kongresszus résztvevőjeként kér szállítást.

VILLAMOS

Debrecen 1-es (és egyetlen) villamosa a legtöbb szálloda és a kongresszus helyszíne között jó közlekedési alternatíva. (A Kölcsey Központhoz a Debrecen Plaza megállónál kell leszállniuk.)

PÉNZÜGYEK – SZÁMLÁZÁS

A megrendelt szolgáltatások költségeit a kiállításra kerülő számlán az érvényes jogszabályok szerint tüntettük fel. Számlamódosítás, új számla kiállítása a kongresszus végéig, legkésőbb 2014. február 15-ig lehetséges. Ezen időpont után nem áll módunkban a megrendelésén és az erről kiállított számlán változtatni.

MÓDOSÍTÁSI, LEMONDÁSI FELTÉTELEK

Esetleges módosítást, lemondást díjmentesen 2014. január 10-ig fogadtunk el. Módosítások, lemondások miatti számlamódosítások díja a rendezvényt megelőzően 2.500Ft+Áfa. A rendezvényt követően kizárólag a számla formai módosítása lehetséges, melynek díja 4.000 Ft+Áfa.

FELELŐSSÉG- ÉS EGYÉB BIZTOSÍTÁS

A kongresszus közzétett részvételi és egyéb díjai nem tartalmazznak baleset-, betegség-, poggyász- és felelősségbiztosítási díjat. Így baleset, betegség és valamely káresemény bekövetkezése esetén a szervezőknek nem áll módjukban semmilyen felelősséget vagy kártérítést vállalni.

„Aludjon rá egyet! 2014.”

Hosszabbítási lehetőség konferenciák esetén

Kösse össze a kellemeset a hasznossal:

hosszabbítsa meg ittartózkodását egy kiadós pihenéssel, ismerje meg a cívisváros nevezetességeit, és válogasson Debrecen széleskörű kulturális programkínálatából!

A csomag tartalma:

- szállás félpanziós ellátással
- a szálloda wellnessrészlegének igénybevétele (a nyitva tartás és üzemelés függvényében)
- fürdőköpeny használata
- vezetékes internet használata a szobákban, korlátlan WiFi szolgáltatás a szálloda egész területén
- áfa, szervizdíj

A csomag ára:

kétágyas standard szobában:

11.500 Ft
/fő/éj + IFA

egyágyas standard szobában:

15.500 Ft
/fő/éj + IFA

Wellness a város felett

400 m²-es wellnessrészleg a Hotel Lycium**** 3. emeletén

Szauna- ceremóniák

Másfél órás szaunaprogramok képzett szaunamesterek vezényletével

Vegye igénybe különleges
masszázskezeléseinket!

BAMBUSZRÚD MASSZÁZS

SVÉDMASSZÁZS, RELAXMASSZÁZS

LOMI-LOMI HAWAII MASSZÁZS

INDIAI FEJMASSZÁZS

CSONTKOVÁCSOLÁS



4026 Debrecen, Hunyadi u. 1-3.

+36 (52) 506-600

+36 (52) 506-601

hotel@hotellycium.hu

www.hotellycium.hu



TÉRKÉP

- | | | |
|---|--|---|
| 1 Kölcsey Központ
4026 Debrecen,
Hunyadi u. 1-3. | 5 Hotel Divinus
4032 Debrecen,
Nagyerdei krt. 1. | 9 Villa Hotel
4032 Debrecen,
Medgyessy sétány 4. |
| 2 Hotel Lycium
4026 Debrecen,
Hunyadi u. 1-3. | 6 Hotel Óbester
4026 Debrecen,
Péterfia u. 49. | 10 Hotel Nagyerdő
4032 Debrecen,
Pallagi út 5. |
| 3 Hotel Aquaticum
4032 Debrecen,
Nagyerdei park 1. | 7 Platán Hotel
4030 Debrecen,
Somlyai u. 10. | 11 Sport Hotel
4032 Debrecen,
Oláh Gábor u. 5. |
| 4 Centrum Hotel
4026 Debrecen,
Kálvin tér 4-8. | 8 Postás Üdülő
4032 Debrecen,
Nagyerdei körút 66. | 12 Vasútállomás |
| | | 13 Autóbusz-pályaudvar |
- 1-es villamos útvonala**



EGIS Biologicals
Beyond Reflexions



RemsimaTM ▼
Infliximab

▼ Ez a gyógyszer fokozott felügyelet alatt áll, mely lehetővé teszi az új gyógyszerbiztonsági információk gyors azonosítását. Az egészségügyi szakembereket arra kérjük, hogy jelentsenek bármilyen feltételezett mellékhatást.

Termékeink árváltozásával és rendelkezésével kapcsolatos információkért forduljon az Egis Gyógyszergyár Nyrt. key account manager kollégáihoz, illetve ezekről tájékozódhat az Országos Egészségbiztosítási Pénztár honlapján: www.oep.hu.

A termék alkalmazásakor az érvényes alkalmazási előírás az irányadó.

Lezárás dátuma: 2014.01.30.

REM4



MB MAGYAR
BRANDS
2013

HEALTHCARE
CELLTRION
A Ray of Excellence

Egis Gyógyszergyár Nyrt. Onkológia és CNS üzletág
1134 Budapest, Lehel utca 15., tel.: 803-22-22, fax: 803-24-59
e-mail: marketing@egis.hu, honlap: www.egis.hu



A SZERVEZŐ BIZOTTSÁG CÍME

Főszervező: Prof. Dr. Szekanecz Zoltán
DE ÁOK Belgyógyászati Intézet Reumatológiai Tanszék
4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel./Fax: 52/255-091
E-mail: szekanecz.zoltan@med.unideb.hu

SZAKDOLGOZÓ TUDOMÁNYOS PROGRAM FŐSZERVEZŐ

Domján Andrea
DE ÁOK Belgyógyászati Intézet Reumatológiai Tanszék
4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel./Fax: 52/255-091
E-mail: domjan.andrea@gmail.com

A SZERVEZŐ IRODA CÍME

CONGRESS & HOBBY SERVICE KFT.
Kongresszus- és Rendezvényszervező Iroda
6701 Szeged, Pf.: 1022.
Telefon: 62/484-531, 484-532
Fax: 62/450-014
E-mail: info@congress-service.hu
Web: <http://congress-service.hu>

A RENDEZVÉNY HONLAPJA

<http://congress-service.hu/2014/drop5>