




P R O G R A M

Debreceni Reumatológiai Oktatási Program

Interdiszciplináris Fórum

A reumatológia-immunológia
összefüggései az ortopédiával,
traumatológiával,
sportorvoslással és
geriátriával



2018. március 22-24.

Debrecen, Kőlcsey Központ

NÉZZÉK,

ÚJRA AKTÍV LEHETEK, MINT AZELŐTT!*



A Cosentyx® az első és egyetlen humán IL-17A gátló terápia spondylitis ankylopoetica kezelésére

* A 150 mg Cosentyx kezelésben részesült spondylitis ankylopoeticában szenvedő betegek 61%-a elérte az ASAS 20 választ a MEASURE 2 vizsgálatban a 16. héten. Ezekben a betegekben a betegségaktivitás jelentősen csökkent (BASDAI), a gerincmobilitás (BASMI) a kiinduláshoz képest jelentősen javult a 16. héten placebohoz hasonlítva. Ezenkívül az egészségi állapottal összefüggő életminőségben (ASQoL), a fizikális funkciókban (BASFI) és a fáradtság (FACIT-F) tekintetében is jelentős javulás mutatkozott a placebohoz képest. A tapasztalat javulások fennmaradtak az 52. hétig.

COSENTYX® 150 mg szekukinumab előretöltött injekciós tollban

Kiadhatóság: Korlátozott érvényű orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer.

Osztályozási kategória SZ. A forgalomba hozatali engedély jogosultjának helyi képviselője: Novartis Hungária Kft. (Pharma részleg), 1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47. Tel: 06-1-457-6500, Fax: 06-1-457-6600.

A forgalomba hozatali engedély száma: **EU/1/14/980/005**

Bővebb információért olvassa el a gyógyszer alkalmazási előírását

A hatályos „alkalmazási előírás” teljes szövegét megtalálja az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (www.ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis/) vagy az Európai Gyógyszerügynökség (www.ema.europa.eu) honlapokon.

A gyógyszer társadalombiztosítási támogatásban nem részesül, társadalombiztosítási támogatással nem rendelhető, így közfinanszírozás alapjául szolgáló ár, támogatási összeg és térítési díj nem adható meg.

Az EMA forgalomba hozatali engedély kiadásának dátuma: 2015.01.15.

Társadalombiztosítási támogatási kérelem benyújtásának dátuma: 2016.12.10.

▼ Ez a gyógyszer fokozott felügyelet alatt áll, mely lehetővé teszi az új gyógyszerbiztonsági információk gyors azonosítását. Az egészségügyi szakembereket arra kérjük, hogy jelentsenek bármilyen feltételezett mellékhatást.



HU1803796657

Lezárás dátuma: 2018. március 5.

 **NOVARTIS**

 **Cosentyx®**
secukinumab



DROP7

PROGRAM

Debreceni Reumatológiai Oktatási Program

Interdiszciplináris Fórum

A reumatológia-immunológia
összefüggései az ortopédiával,
traumatológiával,
sportorvoslással és
geriátriával



2018. március 22-24.

Debrecen, Kőlcsey Központ

Tisztelt Kolléganők és Kollégák, kedves Barátaim!

Immáron 11 éve, hogy a bőrgyógyászokkal és szemészekkel megrendeztük az első DROP interdiszciplináris konferenciát. Ezzel egy Debrecenhez kötődő, de országos, igen sikeres konferenciasorozatot indítottunk el. Az első DROP-ot követte a második a gasztroenterológusokkal, hematológusokkal és onkológusokkal, 2010-ben a harmadik, mely a vascularis immunológiát és reumatológiát tekintette át, 2011-ben a DROP4, melynek a reumatológia és infekciók volt a témája, 2013-ban a DROP5, ahol anyagcsere, endokrin betegségek és pulmonologia volt a téma, majd végül 2016-ban a DROP6 a neurológia, pszichiátria és idegsebészet témakörben. A továbbiakban is két évente tervezzük az interdiszciplináris fórum megrendezését. Bőven van még téma a tarsolyunkban, de lassan a korábban tárgyalt témákat is újra elő kell majd venni. A DROP konferenciákon általában 45-50 előadás hangzott el, és a résztvevők száma mindig elérte a 300-500-at. Ezzel a DROP az egyik legnagyobb hazai konferenciasorozattá nőtte ki magát. Mindez elsősorban nem a szervezők érdeme, hanem az érdeklődő résztvevőké és az előadóké, akik mindig a maximális színvonalon adták át az újabb és újabb ismereteket a hallgatóságnak.

Amellett, hogy nagyon szeretjük ezt a rendezvényt, az sem mellékes, hogy, amint azt a kedves Kollégák visszajelzései is megerősítették, szükség van erre a 2007-ben úttörőnek számító vállalkozásra, amely a medicina egyéb területeit még közelebb hozza a reumatológusokhoz és egymáshoz. Ezért 2018. március 22-24. között a megszokott helyen, a debreceni Kölcsey Központban kerül megrendezésre a DROP7, melynek fő témái ezúttal az ortopédia, traumatológia, sportorvoslás és geriátria lesznek. A reumatológusok, fizioterápiás szakorvosok mellett az ortopédia, traumatológia, kézsebészet, sportorvostan, sportfiziológia, geriátria, gerontológia, belgyógyászat, csecsemő- és gyermekgyógyászat, diabetológia, fertőző betegségek, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, háziorvostan, idegsebészet, infektológia, mellkassebészet, mozgásszervi rehabilitáció, neurológia, radiológia szakorvosai számára a tanfolyam várhatóan kötelező szabadon választott lesz (egy korábbi rendelet értelmében sajnos nem lehet kötelező szinten tartó) és 50 pontra akkreditált.

Ismét sikerült több kiváló előadót „megnyernünk az ügynek”. Szó lesz az egyes testtájak ortopédiai megbetegedéseiről, a törésekről, a kéz elváltozásairól; ezek műtétes ellátásáról, a perioperatív teendőkről és postoperatív rehabilitációról. A sportorvostan témakörében a hazai ellátórendszer áttekintése mellett a sportélettanról, sportsérülésekről, rehabilitációról és az olimpikonok speciális szempontjairól beszélnek majd az előadók. A geriátrián belül a leggyakoribb időskori mozgásszervi kórképek, a gyógyszerelés időskori vonatkozásai, a nem gyógyszeres terápiák, az osteoporosis kerülnek elsősorban terítékre. Kiemeljük a XXI. század újdonságait a 3D ortopédiai módszerektől a sejterápiáig, porcpótlásig. Alkalom lesz megtekinteni az új debreceni Sportdiagnosztikai, Életmód- és Terápiás Központot. És egy esti beszélgetés keretében olimpikonokkal (Risztov Éva, Kálnoki-Kis Attila) és az olimpiai csapatot erősítő orvossal (Prof. Dr. Merkely Béla) is találkozhatnak.

Az előző DROP-okhoz hasonlóan, az orvosi programmal karöltve, egy színvonalas szakdolgozói programot is összeállítunk, mely szintén a fenti témákban, de szakdolgozói szempontból, gyakorlati oldalról közelíti meg a kérdésköröket.

A két estén pedig, a szakmai programtól megfáradva, színes társasági programokon pihenhetik ki magukat. A szakmai együttlét és az esti közös feltöltődés bőven alkalmat ad majd a kapcsolatok ápolására, a szakmapolitikai kérdések megvitatására, a barátságok születésére.

Ennek reményében szeretettel köszöntünk minden résztvevőt a DROP7-en!

Debrecen, 2018. március 22.

Dr. Szekanecz Zoltán
a kongresszus elnöke

A DROP7 IDÓPONTJA

2018. március 22-23-24.

A DROP7 HELYSZÍNE

**Kölesey Központ,
4026 Debrecen, Hunyadi u. 1-3.**

FŐVÉDNÖK

Dr. Papp László
Debrecen megyei jogú város
polgármestere

A KONGRESSZUS VÉDNÖKEI

Prof. Dr. Szilvássy Zoltán
a Debreceni Egyetem rektora

Prof. Dr. Bács Zoltán
a Debreceni Egyetem kancellárja

Prof. Dr. Mátyus László
a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar
dékánja

Prof. Dr. Berényi Ervin
a Debreceni Egyetem Klinikai Központ
elnöke

Prof. Dr. Paragh György
a Debreceni Egyetem Belgyógyászati Intézet
igazgatója

A KONGRESSZUS ELNÖKE

Prof. Dr. Szekanecz Zoltán

A SZAKDOLGOZÓI TUDOMÁNYOS PROGRAM

FŐSZERVEZŐJE

Dr. (jur) Domján Andrea

TUDOMÁNYOS ÉS SZERVEZŐBIZOTTSÁG TAGJAI

Prof. Dr. Szekanecz Zoltán

a kongresszus elnöke

Prof. Dr. Bakó Gyula
Prof. Dr. Csernátó Zoltán
Dr. Karácsonyi Zoltán
Dr. Hunya Zsolt
Dr. Pap Zoltán
Dr. Szántó Sándor
Prof. Dr. Szűcs Gabriella
Dr. Turchányi Béla

Dr. (jur) Domján Andrea
(szakdolgozók)
Molnárné Mile Emma
(szakdolgozók)
Pataki Éva
(szakdolgozók)
Szabóné Törő Anna
(szakdolgozók)

FELKÉRT ELŐADÓK

Bakó Gyula
Bazsó Tamás
Bodolay Edit
Cserhádi Györgyi
Csernátó Zoltán
Csiki Zoltán
Dézsai Zoltán
Fésüs Márton
Frendl István
Gaál János
Győrfi Gyula
Halasi Tamás
Hangody László
Hodinka László
Hunya Zsolt
Juhász Viktória Diana
Karácsonyi Zoltán
Kerekes György
Kiss Jenő
Kiss László
Laki Judit
Magyar János
Manó Sándor
Maresik Ákos
Mecseky László

Merkely Béla
Mikó László
Molnár László
Molnár Szaboles
Muraközy Katalin
Nagy György
Németi Zoltán
P. Szabó Gabriella
Pap Zoltán
Rákóczi Éva
Rybaltovszki Henrik
Simon Tünde
Soltész István
Soós Ágnes
Surányi Péter
Szabó János
Szamosi Szilvia
Szántó Sándor
Széll Gábor
Szendrői Miklós
Szekanecz Éva
Takács Dániel
Turchányi Béla
Végh Edit
Zákány Róza

2018. március 22. (csütörtök)

09.55-10.00	Köszöntő
10.00-11.10	Téma: Tetőtől talpig I.
11.10-11.40	Kávészünet
11.40-12.00	KRKA szimpózium
12.00-13.40	Téma: Tetőtől talpig II.
13.40-14.40	Ebédészünet
14.40-15.50	Téma: Műtétes eljárások I.
15.50-16.20	SANOFI szimpózium
16.20-16.50	Kávészünet
16.50-17.45	Téma: Műtétes eljárások II.
17.45-18.15	SANDOZ szimpózium
18.15-18.35	SAGER szimpózium
19.00-19.30	Megnyitó, köszöntések
19.30-20.30	Találkozás Olimpikonokkal
20.30-	Vacsora



2018. március 23. (péntek)

08.30-10.10	Téma: Ebcsont beforr...
10.10-10.40	ABBVIE szimpózium
10.40-11.10	Kávészünet, sajtótájékoztató
11.10-11.40	ROCHE szimpózium
11.40-12.50	Téma: Sportorvoslás I.
12.50-13.40	Ebédészünet
13.40-14.10	NOVARTIS szimpózium
14.10-16.00	Téma: Sportorvoslás II.
16.30-	Sportdiagnosztikai, Életmód- és Terápiás Központ látogatás
19.30-	Vacsora

2018. március 24. (szombat)

09.00-10.25	Téma: Geriátria I.
10.25-10.40	BERLIN-CHEMIE szimpózium
10.40-10.50	LILLY szimpózium
10.50-11.20	Kávészünet
11.20-12.15	Téma: Geriátria II.
12.15-12.45	AMGEN szimpózium
12.45-13.45	Ebédészünet
13.45-14.15	PFIZER szimpózium
14.15-14.35	MSD szimpózium
14.35-16.30	Téma: Határterületek I.
16.30-	Tesztírás, zárás

2018. március 23., péntek

08.30-10.10	Geriátria
10.10-10.40	Kávészünet
10.40-12.35	Ortopédia/Traumatológia
12.35-13.30	Ebédszünet
13.30-14.00	FLEX HD
14.00-14.10	Technikai szünet
14.10-16.00	Sportorvoslás
16.00	Tesztírás, zárás
16.30-	Sportdiagnosztikai, Életmód- és Terápiás Központ látogatás
19.30-	Vacsora



9.55 Köszöntő

10.00 Téma: Tetőtől talpig I.

Üléselnökök: Surányi Péter, Hunya Zsolt

**10.00 A vállízület degeneratív és gyulladásos betegségeinek
ortopédsebészeti ellátása**

Hunya Zsolt

Debreceni Egyetem, Ortopédiai Klinika

**10.15 Könyvek: traumás-degeneratív eltérések, protetizálás
Kiss Jenő**

Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak

**10.30 A kéz fájdalmának és deformitásainak differenciáldiag-
nosztikája**

Surányi Péter

Kenézy Egyetemi Kórház, Reumatológiai Osztály

10.45 Kéz: sebészeti korrekciók a reumás kézen

Frendl István

Kenézy Egyetemi Kórház, Traumatológiai és Kézsebészeti Osztály

11.00 Megbeszélés

11.10 KÁVÉSZÜNET

11.40 KRKA szimpózium

**Hatékony gyulladáscsökkentés gyomor-bélrendszeri rizikó
nélkül**

Szántó Sándor

Debreceni Egyetem, Reumatológiai Tanszék

12.00 Téma: Tetőtől talpig II.

Üléselnökök: Nagy György, Soltész István

**12.00 Az arthrosis és derékfájás kialakulásának modern szemlélete
Gaál János**

Kenézy Egyetemi Kórház, Reumatológiai Osztály

- 12.15 Az arthrosis és derékfájás reumatológiai ellátása**
Nagy György
Semmelweis Egyetem, Reumatológiai Tanszék
- 12.30 A láb ortopédiai megbetegedései: pes planus, metatarsalgia, hallux valgus**
Gyórfi Gyula
Debreceni Egyetem, Ortopédiai Klinika
- 12.45 Diabeteses láb**
Mecseky László
Medi Dhoró Kft.
- 13.00 Felnőttkori Scoliosis, Scheuermann kór és SpA következtében kialakult gerinc deformitások műtéti kezelése**
Kiss László
Debreceni Egyetem, Ortopédiai Klinika
- 13.15 Gyermekortopédiai betegségek**
Soltész István
Debreceni Egyetem, Ortopédiai Klinika
- 13.30 Megbeszélés**
- 13.40 EBÉDSZÜNET**
- 14.40 Téma: Műtétes eljárások I.**
Üléselnökök: Csernátony Zoltán, Rybaltovszki Henrik
- 14.40 Az arthroscopia szerepe, lehetőségei és korlátai a térdízületi megbetegedések ellátásban**
Rybaltovszki Henrik
Debreceni Egyetem, Ortopédiai Klinika
- 14.55 Csípőprotetizálás és térdprotetizálás**
Szabó János
Debreceni Egyetem, Ortopédiai Klinika

- 15.10 Sejtterápia: regeneratív medicina a mozgásszervi sebészetben**
Zákány Róza
Debreceni Egyetem, Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet
Csernátony Zoltán
Debreceni Egyetem, Ortopédiai Klinika
- 15.40 Megbeszélés**
- 15.50 SANOFI szimpózium**
- Izombetegség diagnosztika és kezelés a neurológus szemszögéből. Pompe-kór esettanulmány**
Dézsi Livia
- Pompe-kór diagnosztikája, reumatológiai szempontok**
Brugós Boglárka
- 16.20 KÁVÉSZÜNET**
- 16.50 Téma: Műtétes eljárások II.**
Üléselnökök: Hangody László, Szekanecz Zoltán
- 16.50 Új lehetőségek a porcfelszínképzésben**
Hangody László
Semmelweis Egyetem ÁOK, Traumatológiai Tanszék
- 17.05 Perioperatív teendők reumatológiai betegek mozgásszervi műtétei során**
Simon Tünde
Debreceni Egyetem, Ortopédiai Klinika
- 17.20 Az Ortopédiai Klinikán végzett konzervatív kezelés, illetve műtét utáni rehabilitáció eszközei**
Juhász Viktória Diana
Debreceni Egyetem, Ortopédiai Klinika
- 17.35 Megbeszélés**

17.45 SANDOZ szimpózium

A centrális izomrelaxánsok terápiás szerepe a reumatológus és a neurológus szemszögéből

Üléselnök: Szekanecz Zoltán

A centrális izomrelaxánsok szerepe a reumatológus szemszögéből

Szamosi Szilvia

Debreceni Egyetem, Reumatológiai Tanszék

A centrális izomrelaxánsok szerepe a neurológus szemszögéből

Csapó Krisztina

Debreceni Egyetem, Neurológiai Klinika

18.15 SAGER szimpózium

Fájdalomcsillapítás a mozgásszervi kórképekben – fókuszban a lokális terápia és az NSAID-ok

Vereckei Edit

Országos Reumatológiai és Fizioterápiás intézet

18.35 Technikai szünet

19.00 Megnyitó – köszöntések

19.30 Találkozás olimpikonokkal

Szereplők: Risztov Éva, Kálnoki Kis Attila, Merkely Béla

Aki kérdez: Gömör Béla és Szekanecz Zoltán

20.30 Vacsora

Együtt teszünk az RA-s betegekért¹

Több, mint 1 millió kezelt beteg világszerte²

Széleskörű hatásossági adatok és jól megalapozott biztonságossági profil 14 indikációban^{3,4}

A HUMIRA ereje: 10 éves hosszú távú hatásosság RA-ban^{1,3,5-7}

Humira 40 mg oldatos injekció előretöltött fecskendőben (adalimumab), Humira 40 mg oldatos injekció előretöltött injekciós tollban (adalimumab), Humira 40 mg/0,8 ml oldatos injekció gyermekgyógyászati alkalmazásra (adalimumab), Humira 80 mg oldatos injekció előretöltött fecskendőben (adalimumab), Humira 80 mg oldatos injekció előretöltött injekciós tollban (adalimumab), Humira 20 mg oldatos injekció előretöltött fecskendőben (adalimumab)

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/000481/human_med_000822.jsp&mid=WC00b01ac058001d124

Bővebb információért olvassa el a gyógyszer alkalmazási előírását! Forgalomba hozatali engedély jogosultjának helyi képviselője: AbbVie Kft. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7. Telefonszám: +36 1 455 8600. A közfinanszírozás alapjául elfogadott ár: 275 090 Ft. Támogatás összege: 0 Ft. Térítési díj: 275 090 Ft. Forrás: www.neak.gov.hu. Letöltés: 2017.02.05. Az aktuális árak megtalálhatók a www.neak.gov.hu oldalon. A Humira 2012. február 1-től tételes finanszírozás keretében érhető el (OENO kód: 06052) Finanszírozott indikációs kör: reumatoid arthritis, spondylitis ankylopoetica, arthritis psoriatica, juvenilis idiopathiás arthritis; Crohn-betegség felnőtt- és gyermekkori, colitis ulcerosa, psoriasis. A 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet alapján.

Referencia:

1. Keystone et al. Radiographic, clinical, and functional outcomes of treatment with adalimumab (a human anti-tumor necrosis factor monoclonal antibody) in patients with active rheumatoid arthritis receiving concomitant methotrexate therapy: a randomized, placebo-controlled, 52-week trial. *Arthritis Rheum.* 2004;50(5):1400-1411.
2. <https://news.abbvie.com/news/abbvie-humira-adalimumab-receives-chmp-positive-opinion-to-treat-adolescents-with-hidradenitis-suppurativa-chronic-inflammatory-skin-disease.htm>
3. HUMIRA alkalmazási előírás: http://www.ema.europa.eu/docs/hu_HU/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000481/WC500050870.pdf
4. Burmester et al. Adalimumab: long-term safety in 23 458 patients from global clinical trials in rheumatoid arthritis, juvenile idiopathic arthritis, ankylosing spondylitis, psoriatic arthritis, psoriasis and Crohn's disease. *Ann Rheum Dis.* 2013;72(4):517-524. 5. Breedveld et al. for PREMIER Investigators. The PREMIER Study: a multicenter, randomized, double-blind clinical trial of combination therapy with adalimumab plus methotrexate versus methotrexate alone or adalimumab alone in patients with early, aggressive rheumatoid arthritis who had not had previous methotrexate treatment. *Arthritis Rheum.* 2006;52(1):26-37. 6. Keystone et al. Longterm effect of delaying combination therapy with tumor necrosis factor inhibitor in patients with aggressive early rheumatoid arthritis: 10-year efficacy and safety of adalimumab from the randomized controlled PREMIER trial with open-label extension. *J Rheumatol.* 2014 Jan;41(1):5-14.
7. Keystone et al. Clinical, functional, and radiographic benefits of long term adalimumab plus methotrexate: final 10-year data in longstanding rheumatoid arthritis. *J Rheumatol* 2013;40(9):1487-1497.

Kód: HUHUR180024 • Lezárás dátuma: 2018. február 26.

abbvie

AbbVie Kft. • 1095 Budapest Lechner Ödön fasor 7. • Tel: +36 1 455 8600 • Fax: +36 1 455 8699

 **HUMIRA**
adalimumab
destination you™

AZ **1**

REUMATOLÓGIAI
INDIKÁCIÓBAN
TÖRZSKÖNYVEZETT
BIOLOGIKUM^{1,3}
■ A RHEUMATOID
ARTHRITIS
KEZELÉSÉBEN

Enbrel®

Több
mint
400
klinikai
vizsgálat⁴

EDDIG NEM
TAPASZTALTAK
NEUTRALIZÁLÓ
ANTITEST
TERMELŐDÉST^{3,7}

Több
mint
7000
tudományos
közlemény⁵

Stabil,
kiszámítható
adagolás^{6,**}

Hatékony
monoterápiában is^{3,*}

Enbrel
etanercept

* Az Enbrel közepesen súlyos vagy súlyos reumaszerű ízületi gyulladás kezelése esetén önmagában is alkalmazható a metotrexátra való túlérzékenység esetén, vagy akkor, ha a metotrexáttal való folyamatos kezelés nem alkalmas.

** Franciaország, Egyesült Királyság, Németország, Hollandia és Olaszország 44 centrum, 739 betegének retrospektív elemzése alapján 319 etanercept kezelt beteg 2,5%-nál kevesebb dózis-eszkálálási (dózis emelés történt a kiindulási dózissal vagy másik bDMARD-ra történt váltás). Olyan betegek kezelését értékelték a 12. és 18. hónap között, melyeknek a kezelés első 12 hónapjában folyamatosan kezeltek az adott TNF gátlókkal. Az adott kezelést megelőzően más biológikumot nem kaphattak.



Enbrel 25 mg por és oldószer oldatos injekcióhoz 4x (I), Enbrel 25 mg 4x (II), III, 50 mg 4x (III) oldatos injekció előretöltött fecskendőben, Enbrel 50 mg oldatos injekció előretöltött injekciós tollban 4x (IV), Enbrel 10 mg por és oldószer oldatos injekcióhoz gyermekgyógyászati alkalmazásra (V)

Hatóanyag: (I) 25 mg etanercept injekciós üvegenként; (II) 25 mg, III, (III) 50 mg etanercept előretöltött fecskendőnként; (IV) 50 mg etanercept előretöltött injekciós tollanként, (V) 10 mg etanercept injekciós üvegenként.

Alkalmazási előírás:

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/000262/human_med_000764.jsp&mid=WC0b01ac058001d124

Bővebb információért olvassa el a gyógyszer alkalmazási előírását!

A közfinanszírozás alapjául elfogadott ár: (I) 137 670 Ft; (II) 137 670 Ft; (III, III, IV) 275 090 Ft; (V) 55 685 Ft.

A támogatás mértéke: Tételes elszámolás alá eső készítmény. A tételes elszámolás alá eső indikációkat és az elszámolásra jogosult intézményeket lásd a 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet 1/A. számú mellékletében. A tételes elszámolás alá eső indikációban a beteg által fizetendő térítési díj 0 Ft. Az aktuálisan érvényes árról, kérjük, keresse fel Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő honlapját (www.neak.gov.hu).

Rövidítések: RA = rheumatoid arthritis, bDMARD = biologic disease-modifying antirheumatic drug

Referenciák:

1. Scott LJ Drugs. 2014;74:1379-1410. 2. FDA product information, http://www.fda.gov/ohrtm/dockets/ac/01/briefing/3779b2_02_immunex.pdf. 3. Enbrel alkalmazási előírás, 2018. január 25. http://www.ema.europa.eu/docs/hu_HU/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000262/WC500027361.pdf. 4. <http://clinicaltrials.gov> 2018.02.21-i keresés „etanercept”-re 442 találat. 5. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/> 2018.02.21-i keresés „etanercept”-re: 7457 találat. 6. Moots RJ et al. *Clin Exp Rheumatol*. 2011;29:26-34. 7. Garces S et al. *Ann Rheum Dis*. 2013;72(12):1947-1955.



Pfizer Gyógyszerkereskedelmi Kft.
1123 Budapest
Alkotás u. 53. MOM Park „A” épület
Tel: 488-3700, www.pfizer.hu

Az anyag lezárásának dátuma:
2018. február 27.
Kód: PP-ENB-HUN-0006

8.30 Téma: Ebesont beforr...

Üléselnökök: Turchányi Béla, Lakatos Péter

**8.30 Törésgyógyulás, törésgyógyítás osteoporotikus
környezetben, biomechanikai, biológiai és biokémiai
tudásunk tükrében**

Turchányi Béla

Kenézy Egyetemi Kórház, Traumatológiai és Kézsebészeti Osztály

**8.45 A D-vitamin anyagszere és az osteoporosis traumatológiai
összefüggései**

Pap Zoltán

Kenézy Egyetemi Kórház, Traumatológiai és Kézsebészeti Osztály

9.00 Osteoporotikus törések végtagokon

Fésüs Márton

Kenézy Egyetemi Kórház, Traumatológiai és Kézsebészeti Osztály

**9.15 Csigolya összeroppanások minimál invazív kezelése:
vertebroplastica**

Mikó László

Kenézy Egyetemi Kórház, Idegsebészeti Osztály

**9.30 Mit tudunk, illetve kell tenni a traumás gerincelváltozásokkal
mai lehetőségeink birtokában**

Németi Zoltán

Kenézy Egyetemi Kórház, Traumatológiai és Kézsebészeti Osztály

9.45 Ortopédiai szeptikus betegek ellátása

Bazsó Tamás

Debreceni Egyetem, Ortopédiai Klinika

10.00 Megbeszélés

10.10 ABBVIE szimpózium

A TNF alfa szerepe korai arthritisekben

Nagy György¹, Szántó Sándor², Szekanecz Zoltán²

¹*Semmelweis Egyetem, Reumatológiai Tanszék*

²*Debreceni Egyetem, Reumatológiai Tanszék*

10.40 KÁVÉSZÜNET (Sajtótájékoztató)

11.10 ROCHE szimpózium

Üléselnök: Szekanecz Zoltán

Óriássejtes arteritis (GCA) – Gondoljunk gyakrabban rá!

Nagy György

Semmelweis Egyetem, Reumatológiai Tanszék

Az óriássejtes arteritis (GCA) terápiájának legújabb lehetőségei

Szamosi Szilvia

Debreceni Egyetem, Reumatológiai Tanszék

11.40 Téma: Sportorvoslás I.

Üléselnökök: Soós Ágnes, Laki Judit

11.40 A sportoló terhelhetősége – de meddig – a sportorvos szemüvegén át

Soós Ágnes

Országos Sportegészségügyi Intézet

11.55 Sportkórház: Ez a módi egy kicsit más, mint a többi...

Laki Judit

Országos Sportegészségügyi Intézet

12.10 A sport élettani hatásai

Magyar János

Debreceni Egyetem, Élettani Intézet

12.25 A laborvizsgálattól a teljesítménydiagnosztikáig – sportorvosi állapotfelmérés az élsportban

P. Szabó Gabriella

Sportdiagnosztikai, Életmód- és Terápiás Központ

12.40 Megbeszélés

12.50 EBÉDSZÜNET

13.40 NOVARTIS szimpózium

Interjú a reumatológussal, aki tovább lépett

Szamosi Szilvia, Szekanecz Zoltán

Debreceni Egyetem, Reumatológiai Tanszék

14.10 Téma: Sportorvoslás II.

Üléselnökök: Halasi Tamás, Karácsonyi Zoltán

14.10 Sportsérülések korszerű ellátása

Halasi Tamás

Országos Sportegészségügyi Intézet

14.25 A térd sportsérülései – sebészeti ellátási lehetőségek

Karácsonyi Zoltán

Debreceni Egyetem, Ortopédiai Klinika

14.40 Sportrehabilitáció I

Takács Dániel

Sportdiagnosztikai, Életmód- és Terápiás Központ

14.55 Sportrehabilitáció II

Széll Gábor

Sportdiagnosztikai, Életmód- és Terápiás Központ

15.10 Olimpikonok ellátása reumatológiai szempontból

Molnár Szabolcs

MH Központi Honvédkórház, Traumatológiai Osztály

15.25 A sportorvoslás angiológiai vonatkozásai

Kerekes György

Debreceni Egyetem, Belgyógyászati Intézet, Intenzív Osztály

15.40 Sportsérülések (eset bemutatások)

Décsi Zoltán

Kenézy Egyetemi Kórház, Traumatológiai és Kézsebészeti Osztály

15.55 Megbeszélés

16.00 A tudományos program vége

16.30 Sportdiagnosztikai, Életmód- és Terápiás Központ látogatás

19.30 Vacsora

Az egyedüli biológikum, mely törzskönyvezett óriássejtes arteritisben (GCA)¹

**MIKOR ÉRDEMES
ELKEZDENI
A RoACTEMRA
KEZELÉST?**

Szuperior hatékonyság és szteroid-mentes remisszió a kezelés 52. hetében (vs. szteroid monoterápia)²

RoActemrával négyszer több betegnél érték el hosszú távú remissziót, mint a szteroid monoterápiával (56% vs. 14%).²

RoACTEMRA[®]
tocilizumab

Roche

¹. RoActemra SmPC www.ema.europa.eu

². Stone JH et al. NEJM 2017; 377(4): 317-328.

A dokumentum zárásának időpontja: 2018.03.01.

Bővebb információért olvassa el a gyógyszer alkalmazási előírását: www.ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis. Az aktuális árak tekintetében kérjük, ellenőrizze a www.neak.gov.hu honlapon a Publikus gyógyszerterzs - lakossági tájékoztató alatt található információkat.

További információ:
Roche (Magyarország) Kft. 2040 Budaörs, Edison u. 1.
Tel: 06-23-446 800, Fax: 06-23-446 860
Email: hungary.medinfo@roche.com
Internet: www.roche.hu

9.00 Téma: Geriátria I.

Üléselnökök: Hodinka László, Szántó Sándor

9.00 Reumatológiai kórképek időskorban

Szántó Sándor

Debreceni Egyetem, Reumatológiai Tanszék

9.15 Az osteoporosis geriátriai vonatkozásai

Szamosi Szilvia

Debreceni Egyetem, Reumatológiai Tanszék

9.30 Polymyalgia rheumatica és arteritis temporalis

Bodolay Edit

Debreceni Egyetem, Klinikai Immunológiai Tanszék

9.45 Izomfogyás, mozgászavar és törékenység – sarcopenia, dismobility, frailty

Hodinka László

Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet

10.00 Raynaud syndroma és paraneoplasia

Csiki Zoltán

Debreceni Egyetem, Klinikai Immunológiai Tanszék

10.15 Megbeszélés

10.25 BERLIN-CHEMIE szimpózium

Akut fájdalomcsillapítás fix dózisú kombinációval- a gyors és hatékony megoldás

Szamosi Szilvia

Debreceni Egyetem, Reumatológiai Tanszék

10.40 LILLY szimpózium

Időkori RA és a baricitinib

Gaál János

Kenézy Egyetemi Kórház, Reumatológiai Osztály

10.50 KÁVÉSZÜNET

11.20 Téma: Geriátria II.

Üléselnökök: Bakó Gyula, Bodolay Edit

11.20 A gyógyszeres kezelés elvei időskorban

Bakó Gyula

Debreceni Egyetem, Geriátriai Tanszék

11.35 Immunszuppresszív és biológiai kezelés időskorban

Végh Edit

Debreceni Egyetem, Reumatológiai Tanszék

**11.50 Nem gyógyszeres kezelések, balneoterápia, fizioterápia:
előnyök időskorban**

Cserháti Györgyi

Kenézy Egyetemi Kórház, Fürdőgyógyászati Osztály

12.05 Megbeszélés

12.15 AMGEN szimpózium

Üléselnök: Szekanecz Zoltán

Törekedjünk töretlenül!

Szántó Sándor

Debreceni Egyetem, Reumatológiai Tanszék

12.45 EBÉDSZÜNET

13.45 PFIZER szimpózium

**Célba értünk? – JAK kináz gátlók a rheumatoid arthritis
kezelésében**

Szamosi Szilvia

Debreceni Egyetem, Reumatológiai Tanszék

14.15 MSD szimpózium

Egységben az erő – TNF gátlás és metotrexát

Szántó Sándor

Debreceni Egyetem, Reumatológiai Tanszék

14.35 Téma: Határterületek I.

Üléselnökök: Szendrői Miklós, Gömör Béla

14.35 Lágyrészsreumatizmusok – teniszkönyök, Dupuytren betegség, bursitisek

Muraközy Katalin

Kenézy Egyetemi Kórház, Traumatológiai és Kézsebészeti Osztály

14.50 Alagút syndromák. Lehetőségek, irányzatok, eredmények.

Molnár László

Kenézy Egyetemi Kórház, Traumatológiai és Kézsebészeti Osztály

15.05 Infekciós arthritisek, mozgásszervi infekciók

Rákóczi Éva

Debreceni Egyetem, Infektológiai Tanszék

15.20 A mozgásszervrendszer primer tumorai

Szendrői Miklós

Semmelweis Egyetem, Ortopédiai Klinika

15.35 Áttétes daganatok a mozgásszervrendszerben

Szekanecz Éva

Debreceni Egyetem, Onkológiai Intézet

15.50 Mozcáásszervi segédeszközök, orthesisek

Marcsik Ákos

Debreceni Egyetem, Reumatológiai Tanszék

16.05 Korszerű 3D technikák alkalmazása a mozgásszervi sebészetben

Manó Sándor

Debreceni Egyetem, Ortopédiai Klinika

16.20 Megbeszélés

16.30 Tesztírás, a konferencia zárása

Egy anti-TNF, ami elkísér

A SIMPONI hatásossága 5 éven át fennmaradt,
kb. 70%-os terápián maradással¹⁻³

havi
Simpsoni
golimumab

Az aktív évekért

SIMPONI (golimumab) 50 mg oldatos injekció előretöltött injekciós tollban (1x), ill. előretöltött fecskendőben (1x) (fogyasztási ára: 318 740 Ft; tb-támogatás: 100%, tételes elszámolás alá eső készítmény a 70/2011. (XII. 23.) és a 2/2012. (I. 3.) NEFMI rendeletek alapján [esetleges változások: www.oepp.hu]). **Javallatok:** 1. **Rheumatoid arthritis (RA):** metotrexáttal (MTX) kombinálva: közepesen súlyos/súlyos aktív RA kezelésére felnőtteknél, ha a betegség lefolyását módosító reuma elleni gyógyszerekkel (DMARD-ok, beleértve a MTX-et is) a terápiás válasz nem volt megfelelő; súlyos, aktív, progresszív RA kezelésére korábban MTX-tal nem kezelt felnőtteknél. 2. **Polyarticularis juvenilis idiopathiás arthritis (pJIA)** kezelésére MTX-tal kombinálva a korábbi MTX-kezelés nem megfelelően reagáló, legalább 40 kg testtömegű gyermekeknél. 3. **Aktív és progresszív arthritis psoriatica (APs)** kezelésére felnőtteknél monoterápiában v. MTX-tal kombinálva, ha a korábbi DMARD-ok hatása nem volt megfelelő. 4. **Axiális spondyloarthritis:** súlyos, aktív spondylitis ankylopoetica (SA) kezelésére felnőtteknél, akik nem reagáltak megfelelően a hagyományos kezelésre; a gyulladás objektív tüneteit mutató (melyet emelkedett C-reaktív protein szint (CRP) és/vagy MRI vizsgálati eredmény igazol) súlyos, aktív, nem-radiológiai axiális spondyloarthritis (nr-axiális SpA) kezelésére felnőtteknél, amennyiben az előzetesen alkalmazott nem szteroid gyulladásgátló szerekkel (NSAID) történt kezelés hatása nem volt megfelelő, vagy NSAID intolerancia áll fenn. 5. **Közepesen súlyos colitis ulcerosa (CU)** kezelésére felnőtteknél, akik nem reagáltak megfelelően a hagyományos kezelésre, beleértve a kortikoszteroidokat, a 6-merkaptopurint v. az azatioprint is, vagy ezeket a kezeléseket nem tolerálták, ill. azokkal szemben orvosi ellenjavallattal áll fenn. **Ellenjavallatok:** a készítmény hatóanyagával v. bármely segédanyagával szembeni túlérzékenység. Aktív tuberkulózis (tbc) v. egyéb súlyos fertőzés, pl. szepszis, opportunista fertőzések. Közepesen súlyos v. súlyos szívelégtelenség (NYHA III/IV stádium). **Adagolás és alkalmazás:** a kezelést csak RA, pJIA, APs, SA, nr-axiális SpA vagy CU diagnosztizálásában és kezelésében jártas szakorvos kezdeményezheti és felügyelheti. A SIMPONI-val kezelt betegeknek egy betegjátékosztató kártyát kell kapniuk. Adagja RA, pJIA (legalább 40 kg testtömegű gyermekeknek), APs, SA, nr-axiális SpA esetén havonta 1x 50 mg sc., a hónapnak ugyanazon a napján adva, RA és pJIA esetén MTX-tal kombinálva. CU esetén a kezdő adag 200 mg, melyet a 2. héten 100 mg, majd ezután minden 4. héten a 80 kg-nál kisebb testtömegű betegeknek 50 mg, a 80 kg, v. ennél nagyobb testtömegű betegeknek 100 mg követ. A fenntartó kezelés során a kortikoszteroidok fokozatosan lephetnek a klinikai gyakorlati útmutatóknak megfelelően. A klinikai válasz rendszerint 12-14 hét (3-4 dózis) után jelentkezik. Ha ebben az időszakban nem mutatkozik semmilyen terápia előrelépés, a kezelés folytatását át kell gondolni. **Felügyeleti követelmények:** Infekciók: a kezelés előtt, alatt és befejezése után akár 5 hónapig gondosan figyelni kell az infekciókra, beleértve a tbc-t is. A TNF-gátlókat kapók fokozottan veszélyeztetettek. A kezelés előtt és a tbc-vel szemben inaktív (latens) tbc- és a HBV-fertőzés megjelölését. Aktiv tbc: SIMPONI-kezelést tilos kezdeni. Latens tbc: megfelelő tbc-elleni terápiát kell kezdeni a SIMPONI-kezelés megkezdése előtt. A SIMPONI-kezelés alatt gondosan ellenőrizni kell az aktív tbc-re utaló panaszokat és tüneteket. SIMPONI-kezelést igénylő HBV-t hordozó betegek: a kezelés alatt és befejezése után több hónapig gondosan figyelni kell a reaktiválódás jeleire. A HBV reaktiválódásának megelőzésére TNF-gátlóval egyidejűleg adott antivirális terápia hatásossága nem ismert. A HBV reaktiválódása esetén a SIMPONI-kezelést meg kell szakítani, és hatásos antivirális terápiát, megfelelő szupportív kezelést kell kezdeni. **Roszcindulátus daganatok és lymphoproliferatív betegségek:** TNF-gátlókkal kezelték a lymphomák, leukémia, v. egyéb malignitások kifejlődésének kockázata nem zárható ki. TNF-gátló-kezelés kezdését gondosan mérlegelni kell, ha a kórelőzményben rosszindulatú daganat szerepel, ill. megfontolandó a kezelés folytatása, ha malignitás alakul ki. A hepatosplenikus T-sejtes lymphoma kialakulásának kockázata TNF-gátlókkal kezelt betegek esetében nem zárható ki: az AZA v.

6-MP és a SIMPONI kombinációjának potenciális veszélye megfontolást igényel. Azon betegeknek, akiknek kórelőzményében vastagbél dysplasia v. carcinoma szerepel, vagy akiknél fokozott ezek kialakulásának veszélye, rendszeres időközönként szűrővizsgálatokat kell végezni a kezelés megkezdése előtt, valamint a betegség fennállásának ideje alatt, ill. akiknél újonnan diagnosztizáltak dysplasiát, át kell gondolni, hogy a terápia folytatható-e. A TNF-gátlók alkalmazása körültekintést igényel COPD-s, valamint a malignitások szempontjából az erős dohányzás miatt magasabb kockázatú betegek esetén. Időszakos bőrvizsgálat javasolt, különösen a bőrreakciók kockázati tényezőivel rendelkező betegeknek. **Pangásos szívelégtelenség:** körültekintően kell alkalmazni enyhé szívelégtelenségben (NYHA I/II). **Neurológiai események:** demyelinisációs körkép esetén a kezelés előtt gondosan mérlegelni kell annak előnyét és kockázatát. Ha ezek a körképek kialakulnak, mérlegelni kell a kezelés leállítását. Sebészeti beavatkozások: tervezésükkor figyelembe kell venni a hosszú felépítési időt. A kezelés alatt műtendő betegnél figyelni kell a fertőzések kialakulására, és meg kell tenni a megfelelő intézkedéseket. **Autoimmun folyamatok:** lupus-szerű szindróma utaló tünetek és kétszálú DNS elleni antitest-pozitivitás esetén a kezelést abba kell hagyni. **Hematológiai reakciók:** a kezelés leállítását megerősített, jelentős haematológiai eltérésekkel meg kell fontolni. **Váltás biológiai DMARD-ok között:** figyelni kell a fertőzések kialakulásának jeleire. **Allergiás reakciók:** súlyos allergiás reakció esetén a SIMPONI adását azonnal be kell fejezni, és megfelelő kezelést kell kezdeni. **Latens szennyeződés:** az injekciós toll tünjének védőkapuk latex tartalmú, az arra érzékenyeknél allergiás reakciót válthat ki. **Különleges betegcsoportok:** idősök (>65 év) kezelését körültekintően kell végezni, kiemelt figyelmet fordítva a fertőzések előfordulására. Beszűkült vese- v. májműködésű betegeknek nem végeztek specifikus vizsgálatokat. Beszűkült májműködésű betegeknek óvatosan kell adni. Gyermekgyógyászati betegneként javasolt, hogy a SIMPONI-kezelés megkezdése előtt a hatályos védőoltási irányelveknek megfelelően megkapjanak minden védőoltást. 18 évesnél fiatalabb betegeknek a pJIA-tól eltérő indikációra vonatkozóan nem igazolták biztonságosságát és hatásosságát. **Interakciók:** SIMPONI és anakinra, abatacept v. egyéb biológiai terápiák kombinált alkalmazása nem ajánlott. A SIMPONI-val egyidejűleg nem adhatók élő vakcinák, ill. terápiás alkalmazású fertőző ágensek alkalmazása nem javasolt. Egyidejű TNF-kezelés: az adatok nem utalnak arra, hogy akár a SIMPONI, akár a MTX adagjának megváltoztatására lenne szükség. **Terhesség és szoptatás:** terhes nőknél nem ajánlott. Fogamzóképes nőknél hatékony fogamzásgátlást kell alkalmazni, és az folytatni kell az utolsó adagotól számítva min. 6 hónapig. A kezelés alatt és az utolsó adagotól számítva min. 6 hónapig nem szabad szoptatni. **Főbb mellékhatások (1-5):** felső légúti infekciók (nasopharyngitis, pharyngitis, laryngitis, rhinitis), bakteriális fertőzések (cellulitis), alsó légúti fertőzés (pneumonia), vírusfertőzés (influenza, herpes), bronchitis, sinusitis, felületes gombafertőzések, abszcessus, anaemia, allergiás reakciók (bronchospasmus, hyperszenzitivitás, urticaria), autoantitest-pozitivitás, depresszió, álmatlanság, szédülés, fejfájás, parasthesia, hypertensio, asthma és a kapcsolódó tünetek (spiolégzés, bronchiális hyperaktivitás), dyspepsia, gastrointestinalis és abdominális fájdalom, hányinger, gastrointestinális gyulladásos megbetegedések (gastritis, colitis), stomatitis, ALT/AST-emelkedés, pruritus, kiütés, alopecia, dermatitis, ídő aszthenia, az injekció beadási helyén jelentkező reakciók (erythema, urticaria, induratio, fájdalom, vérárfutás, viszketés, irritáció, parasthesia), melkasi diszcomfor, csontörsegek. A gyermekgyógyászati vizsgálatban (pJIA) a jelentett nemkívánatos események típusa és gyakorisága általában hasonló volt a felnőttek bevonásával végzett RA vizsgálatokhoz megfigyelhetőekhez.

Felírás előtt, kérjük, olvassa el a teljes alkalmazási előírást, különös tekintettel a javallatokra (4.1), az adagolásra (4.2), az ellenjavallatokra (4.3) és a felügyeleti követelményekre (4.4) (03/05/2017 EMEA/H/C/992/IA/076).

Referenciák: 1. Deodhar A, et al. Ann Rheum Dis. 2015; 74(4): 757-761. 2. Kavanaugh A, et al. Ann Rheum Dis. 2014; 73(9): 1689-1694. 3. Keystone EC et al. J Rheumatol. 2016; 43:298-306.



MSD Pharma Hungary Kft.
1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 8.,
Telefon: 06-1-888-5300, Fax: 06-1-888-5388, hungary_msd@merck.com

A dokumentum lezárásának ideje: 2017. augusztus 10.
RHEU-1196202-0033

SZAKDOLGOZÓI SZEKCIÓ PROGRAM

8.30 Téma: Geriátria

Üléselnökök: Domján Andrea, Szabóné Törő Anna

8.30 Öregedő társadalom, geriátria helye az egészségügyi ellátás rendszerében

Szabóné Törő Anna

DE KK Belgyógyászati Klinika „C” épület

8.45 Reumatológiai kórképek ápolási vonatkozásai időskorban

Domján Andrea

Debreceni Egyetem, Reumatológiai Tanszék

9.00 Sérülések, elesések időskorban

Szöllősi Gabriella

Debreceni Egyetem, Belgyógyászati Klinika „C” épület

9.15 Balneoterápia előnyei időskorban (fürdőkezelések, szanatóriumi ellátások)

Komár-Pollák Barbara, Nagy Roland

Debreceni Egyetem, Reumatológiai Tanszék

9.30 Gyógytornász – fizioterapeuta szerepe a geriátriában

Czakó Géza

Debreceni Egyetem, Belgyógyászati Klinika „C” épület

9.45 Az időskor egyik legrettegettebb kórképe: a clostridium difficile okozta colitis

Mozga Csabáné

Debreceni Egyetem, Belgyógyászati Klinika „C” épület

10.00 Megbeszélés

10.10 KÁVÉSÜNET

SZAKDOLGOZÓI SZEKCIÓ PROGRAM

- 10.40 Téma: Ortopédia/Traumatológia**
Üléselnökök: Molnárné Mile Emma, Pataki Éva
- 10.40 Konzervatív kezelés lehetőségei totál endoprotézisek beültetését megelőzően, valamint a protézizálás indikációi, kontraindikációi**
Barkóczy Dóra
Debreceni Egyetem, Ortopédiai Klinika
- 10.55 A fizioterápia szerepe total endoprotézisek beültetését követően**
Juhász Viktória
Debreceni Egyetem, Ortopédiai Klinika
- 11.10 Gerincdeformitások műtéti kezelését követő rehabilitációs lehetőségek**
Barkóczy Dóra
Debreceni Egyetem, Ortopédiai Klinika
- 11.25 Csípőtáji törötték operatív ellátása osztályunkon**
Molnárné Furó Erika
Kenézy Egyetemi Kórház, Traumatológiai és Kézsebészeti Osztály
- 11.40 A felső végtag sérülései és ellátási lehetőségei**
Molnárné Mile Emma
Kenézy Egyetemi Kórház, Traumatológiai és Kézsebészeti Osztály
- 11.55 Rheumatoid arthritises betegek kézrekonstrukciós műtéti megoldása**
Horváth Csilla
Kenézy Egyetemi Kórház, Traumatológiai és Kézsebészeti Osztály
- 12.10 Gyógyászati segédeszközök, ortézisek fajtái**
Kissné Deák Anita
Kenézy Egyetemi Kórház, Traumatológiai és Kézsebészeti Osztály
- 12.25 Megbeszélés**
- 12.35 EBÉDSZÜNET**
- 13.30 Bemutatkozik a debreceni aerobic, avagy a FLEX HD Sportegyesület fennállásának legemlékezetesebb pillanatai**
Előadó: Kovácsné Laurinyecz Julianna

SZAKDOLGOZÓI SZEKCIÓ PROGRAM

14.00 Technikai szünet

14.10 Téma: Sportorvoslás II.

Üléselnökök: Halasi Tamás, Karácsonyi Zoltán

14.10 Sportsérülések korszerű ellátása

Halasi Tamás

Országos Sportegészségügyi Intézet

14.25 Térd sportsérülései-sebészeti ellátási lehetőségek

Karácsonyi Zoltán

Debreceni Egyetem, Ortopédiai Klinika

14.40 Sportrehabilitáció I

Takács Dániel

Sportdiagnosztikai, Életmód- és Terápiás Központ

14.55 Sportrehabilitáció II

Széll Gábor

Sportdiagnosztikai, Életmód- és Terápiás Központ

15.10 Olimpikonok ellátása reumatológiai szempontból

Molnár Szabolcs

MH Központi Honvédkórház, Traumatológiai Osztály

15.25 A sportorvoslás angiológiai vonatkozásai

Kerekes György

Debreceni Egyetem, Belgyógyászati Intézet, Intenzív Osztály

15.40 Sportsérülések (eset bemutatások)

Dézi Zoltán

Kenézy Egyetemi Kórház, Traumatológiai és Kézsebészeti Osztály

15.55 Megbeszélés

16.00 Tesztírás, zárás

16.30 Sportdiagnosztikai, Életmód- és Terápiás Központ látogatás

19.30 Vacsora

ÚJ ORÁIS KEZELÉSI LEHETŐSÉG AZ AKTÍV KÖZEPESEN SÚLYOS VAGY SÚLYOS RA-S BETEGEKKEL

akik nem reagálnak megfelelően vagy intoleránsak egy vagy több DMARD gyógyszerre¹

Az Olumiant (baricitinib) a Janus-kináz
JAK1 és JAK2 szelektív és reverzibilis inhibitora¹

Az Olumiant (baricitinib) alkalmazható
monoterápiában vagy metotrexáttal kombinációban¹

Az Olumiant (baricitinib) filmtabletta javasolt dózisa 4 mg naponta
egyszer. A 2 mg-os napi egyszeri dózis a megfelelő 75 éves vagy annál
idősebb betegek esetében, és megfelelő lehet azoknak a betegeknek,
akiknek a kórtörténetében krónikus vagy visszatérő fertőzés szerepel¹

OLUMIANT RÖVIDÍTETT ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁSA:

A gyógyszer neve: Olumiant 2 mg illetve 4 mg filmtabletta. Minőségi és mennyiségi összetétel: 2 mg illetve 4 mg baricitinib filmtablettaként. Terápiás javallatok: Az Olumiant a közepesen súlyos, illetve súlyos, aktív rheumatoid arthritis kezelésére szolgál azokról a felnőtt betegekről, akik nem reagáltak megfelelően, vagy intoleránsak egy vagy több betegséggimoldó rheumás gyógyszerre. Az Olumiant alkalmazható monoterápiában vagy metotrexáttal kombinációban. **Adagolás és alkalmazás:** A kezelést a rheumatoid arthritis diagnózisában és kezelésében jártas orvosnak kell elkezdenie. Az Olumiant javasolt dózisa 4 mg naponta egyszer 75 éves vagy annál idősebb betegeknek a 2 mg-os napi egyszeri dózis a megfelelő, illetve azoknak a betegeknek, akiknek a kórtörténetében krónikus vagy visszatérő fertőzés szerepel. A 2 mg-os napi egyszeri dózis alkalmazását meg lehet fontolni azoknál a betegeknél, akiknél a betegség aktív tartós kontrollja a napi egyszeri 4 mg-os dózissal elérhető, és alkalmasak a dózis csökkentésére. A kezelés nem kezdhető el azoknál a betegeknél, akiknél az abszolút limfocytaszám kevesebb, mint 0,5x10⁹ sejt/l, az abszolút neutrophilszám kevesebb, mint 1x10⁹ sejt/l vagy a haemoglobin érték kisebb, mint 8 g/dl. A kezelést elkezdhető, ha az értékek ezen határértékek fölé emelkedtek. A javasolt dózis: 2 mg naponta egyszer 30-40 ml/perc közötti kreatinin-clearance esetén. Az Olumiant alkalmazása nem javasolt azoknál a betegeknél, akiknél a kreatinin-clearance <30 ml/perc. Enyhé vagy közepesen súlyos májárosodás esetén a dózis módosítása nem szükséges. Az Olumiant alkalmazása nem javasolt súlyos májárosodásban szenvedő betegeknél. Erős gátló potenciállal rendelkező organikus anion transzporter 3 inhibitorokat, pl. probenecidet, sósó betegeknél a javasolt dózis 2 mg naponta egyszer. A klinikai tapasztalat 75 éves vagy annál idősebb betegekkel nagyon korlátozott: ezeknél a betegeknél a 2 mg-os kezdő dózis a megfelelő. Az Olumiant biztonságosságát és hatásosságát 0-18 éves korú gyermekek és serdülők esetében nem igazolták. Az Olumiant-ot naponta egyszer kell bevenni, étkezés közben vagy attól függetlenül, a nap folyamán bármikor. **Ellenjavallatok:** A készítmény hatásanyagával vagy bármely segédanyagával szembeni túlérzékenység (értesítés). **Különleges figyelmeztetések és az alkalmazással kapcsolatos óvintézkedések:** Az Olumiant-kezelés kockázatait és előnyeit gondosan kell mérlegelni a kezelés megkezdése előtt azoknál a betegeknél, akik aktív, krónikus vagy visszatérő fertőzésekben szenvednek. Fertőzés kialakulása esetén a beteg gondosan kell monitorozni, és az Olumiant-kezelést átmenetileg le kell állítani, ha a beteg nem reagál a standard terápiára. Az Olumiant-kezelés csak a fertőzés gyógyulását követően indítható újra. Az Olumiant-kezelés megkezdése előtt a betegeket tuberculozissal kell szűrní. Az Olumiant nem adható aktív tuberculozissal szenvedő betegeknél. A korábban kezelt, látni tuberculozissal szenvedő betegeknél meg kell fontolni az antituberculozis kezelés alkalmazását az Olumiant-kezelés megkezdése előtt. Ha a betegnél herpes zoster alakul ki, az Olumiant-kezelést átmenetileg le kell állítani az epizód gyógyulásáig. A vírusos hepatitis zórását az Olumiant-kezelés megkezdése

előtt a klinikai irányelveknek megfelelően el kell végezni. Az élő, attenuált vakcinák alkalmazása az Olumiant-kezelés alatt, vagy közvetlenül előtte nem javasolt. A lipid paramétereket az Olumiant-kezelés elkezdése után körülbelül 12 héttel ellenőrizni kell, és ezt követően a beteget a hyperlipidaemiára vonatkozó nemzetközi klinikai irányelveknek megfelelően kell kezelni. Ha a beteg rutin vizsgálata során az ALT vagy AST emelkedése észlelhető és a gyógyszer által kiváltott májárosodás feltételezhető, az Olumiant-kezelést átmenetileg le kell állítani, amíg ezt a diagnózist ki nem zárják. Baricitinibbel kezelt betegeknél mélyvénás trombózis (deep venous thrombosis, DVT) és pulmonális embólia (pulmonary embolism, PE) események előfordulását jelentették. Az Olumiant-ot körültekintően kell alkalmazni DVT/PE kockázati tényezőivel rendelkező betegeknél. A DVT/PE klinikai jellemzőinek feltételezése esetén az Olumiant-kezelést átmenetileg meg kell szakítani, a betegeket azonnal meg kell vizsgálni, majd megfelelő kezelésben kell részesíteni. **Mellékhatások:** A leggyakrabban jelentett gyógyszer-mellékhatások, amelyeket az Olumiant-monoterápiával vagy a hagyományos, szintetikus DMARD-okkal történő kombinációval kezelt betegek 32%-ánál figyeltek meg, az emelkedett LDL-koleszterinszint (33,6%), a felső légúti fertőzések (14,7%) és a hányinger (2,8%) voltak. Gyakori mellékhatásai: 1/100 – <1/10: Herpes zoster, Herpes simplex, gastroenteritis, húgyúti fertőzések, thrombocytosis (>600x10⁹ sejt/l), emelkedett ALT >3xULT. **Különleges tárolási előírások:** Ez a gyógyszer nem igényel különleges tárolást. **A forgalomba hozatali engedély száma:** Olumiant 2 mg filmtabletta: EU/1/16/1170/008. Olumiant 4 mg filmtabletta EU/1/16/1170/016. Az alkalmazási előírás legutóbbi frissítésének dátuma: 2017.11.09.

Kiadathóság, ár, TB támogatás: Kiszárolag orvosi vényre adható ki, a készítmény jelenleg szabványos készítmény TB támogatásban részesülő beteg számára. **Bővebb információért kérjük, olvassa el a gyógyszer részletes alkalmazási előírását, amelyet kérésre elküldünk Önnek!** A rövidített alkalmazási előírás jóváhagyásának dátuma: 2017.11.09.

A forgalomba hozatali engedély jogosultjának magyarországi képviselője: Lilly Hungaria Kft., 1075 Budapest, Madách u. 13.14. Telefon: 328-5100, Fax: 328-5101, www.lilly.hu

A forgalomba hozatali engedély jogosultja kötelezi magát, hogy a forgalomba hozatali engedély 1.8.2 modulában leírt, jóváhagyott kockázatkezelési tervben, illetve annak jóváhagyott frissített verziójában részletezett, kötelező farmakovigilanciás tevékenységeket és beavatkozásokat elvégzi. A program legfontosabb célja a gyógyszer felírók számára világossá tenni a gyógyszer használatával kapcsolatos kockázatokot, illetve felhívni a figyelmet az Olumiant-kezelés előtt és közben alkalmazandó specifikus kockázat-minimalizálásra irányuló intézkedésekre.

Ez a gyógyszer fokozott felügyelet alatt áll, mely lehetővé teszi az új gyógyszerbiztonsági információk gyors azonosítását. Az egészségügyi szakembereket arra kérjük, hogy jelentsek bármilyen felleltetett mellékhatást.

Hivatkozás: 1. Olumiant alkalmazási előírás

Lilly Hungaria Kft. 1075 Budapest, Madách u. 13.14.

PP-BA-HU-0004-A dokumentum záráskának dátuma: 2018. február 01.

Lilly

ARANY FOKOZATÚ EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNER



EZÜST FOKOZATÚ EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK

abbvie



BRONZ FOKOZATÚ EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK

AMGEN



SANDOZ A Novartis Division



SANOFI GENZYME



KIÁLLÍTÓK / HIRDETŐK

Aestar Healthcare Kft.
BEMER Medicintechnika Kft.
Berlin-Chemie/A.Menarini Kft.
Goodwill Pharma Kft.
Kőrös-Net Kft.
Lukács Ortopédcipő Kft.
Lux Hungária Kft.
Medicina Könyvkiadó Zrt.
Mesopharma Kft.
Mozaik Air&Holiday Kft.
Promenade
Richter Gedeon Nyrt.
Sager Pharma Kft.
SpringMed Kiadó Kft.
Teva Gyógyszergyár Zrt.
UCB Magyarország Kft.

HELYSZÍNI REGISZTRÁCIÓS IRODA NYITVATARTÁSA

Március 22-én, csütörtökön: 8.00-19.00

Március 23-án, pénteken: 8.00-18.00

Március 24-én, szombaton: 8.30-16.30

A regisztrációs iroda telefonszáma: 30/977-4007

(csak március 22-23-24-én hívható!)

RÉSZVÉTELI DÍJAK A HELYSZÍNEEN

Normál regisztráció	50 000 Ft (39 370 Ft + ÁFA)
Nyugdíjasok, szakorvosjelöltek, rezidensek	40 000 Ft (31 496 Ft + ÁFA)
PhD hallgatók, szakdolgozók	35 000 Ft (27 559 Ft + ÁFA)
Cégek képviselői	40 000 Ft (31 496 Ft + ÁFA)
Napijegy	22 000 Ft (17 323 Ft + ÁFA)

REGISZTRÁCIÓS DÍJAK

A részvételi díjak (kivéve napi díj) 18 900 Ft közvetített étkezést tartalmaznak, melyet a számlán feltüntetünk.

A regisztrált résztvevők részvételi díja tartalmazza:

- Résztvételt a szakmai programon
- Az akkreditációs pontokat
- A kiállítás megtekintésének jogát
- Programfüzetet
- Kongresszusi táskát, jegyzetfüzetet, tollat
- Kávészüneteket 3 napra
- Vacsorát március 22-23-án

Céges regisztráció tartalmazza:

- Résztvételt a szakmai programon
- Programfüzetet
- Kávészüneteket 3 napra
- Vacsorát március 22-23-án

Napijegy tartalmazza:

- Résztvételt az adott napi szakmai programon
- Kiállítás megtekintésének jogát

EBÉD

Március 22-23-24-én a továbbképzés helyszínén, a Hotel Lycium Éttermében.

Díja: 4 400 Ft/ebéd

LÁTOGATÁS A SPORTDIAGNOSZTIKAI ÉLETMÓD ÉS TERÁPIÁS KÖZPONTBAN (SET)

Március 23 -án, 16.30 -19.00 óra között a DROP7 résztvevői szervezett látogatáson vehetnek részt a Sportdiagnosztikai Életmód és Terápiás Központban

Bővebben a SET-ről: www.setcenter.hu

A vezetett látogatás várható időtartalma maximum 30 perc.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Kölcsey Központ és a SET között a DROP7 résztvevői számára térítésmentes busztranszfert biztosítunk (a buszindulások menetrendjéről a helyszínen, a regisztrációs standnál tájékozódhat). A SET megközelíthető helyi tömegközlekedéssel vagy gyalogosan is.

ELŐADÁSOK

Kérjük az előadókat, hogy a számítógépes anyagok előkészítését időben végezzék el és legkésőbb a szekciók előtti szünetben adják le azokat a megadott helyen. A szoros időbeosztás miatt kérjük a rendelkezésre álló idő pontos betartását!

NÉVKITŰZŐ

A kongresszus ideje alatt kérjük a névkitűző használatát a helyszínre történő belépéshez

AKKREDITÁCIÓ

A **DROPT7** a belgyógyászat, csecsemő-gyermekgyógyászat, diabetológus, fizioterápia, geriátria, gerontológia, háziorvostan, idegsebészet, infektológia, kézsebészet, mellkassebészet, neurológia, ortopédia, ortopédia és traumatológia, radiológia, reumatológia, sportfiziológia, sportorvostan, traumatológia, valamint ezen szakterületeken dolgozó szakdolgozók részére akkreditált szabadon választható továbbképző rendezvény, kódja: DE ÁOK/2018.I./00015

Tesztírás kötelező, orvosoknak 48 kreditpontról adunk igazolást.

Kérjük, hogy a regisztráció alkalmával a jelenléti ívet mindenki írja alá, ill. adja meg nyilvántartási számát, mert ez a részvétel elismerésének feltétele!

Az előre megrendelt szállodai szobákat a résztvevő(k) nevére lefoglaltuk, azok a megküldött visszaigazolás szerint vehetők igénybe, általában az érkezés napján 14 órától az elutazás napján 10 óráig. Korábbi érkezés vagy későbbi elutazás esetén a csomagok elhelyezésében a szállodai porták nyújtanak segítséget.

SZÁLLÁSHELYEK

Hotel Lycium****

4026 Debrecen, Hunyadi u. 1-3.

A szálloda a belvárosban található a kongresszus helyszíne, a Kölcsey Központ mellett.

Az ár tartalmazza a svédasztalos reggelit, a wellness és fitness részleg használatát, business corner használatot és internet használatot.

Parkolás: fedett mélygarázsban 2300 Ft/szgk./éj.

Hotel Divinus*****

4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 1.

A szálloda a Nagyerdőn található, a villamos vonal mellett.

Az ár tartalmazza a büféreggelit, a szálloda wellness és fitness részlegének használatát, valamint vezetékes és wifi internethasználatot.

Parkolás: a szálloda előtt, foglaltság függvényében ingyenes, a szálloda mélygarázsában 3.000 Ft/autó/nap

Aquaticum Termál és Wellness Hotel****

4032 Debrecen, Nagyerdei park 1.

A szálloda a Nagyerdőn található, a villamos vonalától pár perc sétára.

Az ár tartalmazza a svédasztalos reggelit és ingyenes wifi használatot.

Parkolás: felszíni parkolóban 3.000 Ft/szgk/nap, a mélygarázsban 1.500 Ft/szgk/nap

Centrum Hotel***

4026 Debrecen, Kálvin tér 4-8.

A szálloda a belvárosban található, a kongresszus helyszínétől 5 perc sétára.

Az ár tartalmazza a svédasztalos reggelit, kávé-tea bekészítést vízforralóval, valamint korlátlan vezeték nélküli Internet használatot.

Parkolás: a szállodával szemben található parkolóban ingyenes.

Hunguest Hotel Nagyerdő Debrecen***

4032 Debrecen, Pallagi út 5.

A szálloda Debrecen legszebb zöldövezeti területén, a Nagyerdő szívében fekszik.

Az ár tartalmazza a büfé asztalos reggelit, a szálloda saját fedett termálvizes medencéjének és szaunájának használatát, illetve ingyenes WIFI használatot.

Parkolás: a szálloda parkolójában díjmentes

Hotel Óbester****

4026 Debrecen, Péterfia u. 49.

A szálloda a belvárosban található, a villamosvonal mellett, 10 percnyi sétára a kongresszus helyszínétől.

Az ár tartalmazza a svédasztalos reggelit, díjmentes WIFI használatot, a szálloda Wellness Szigetének, valamint fitness termének korlátlan használatát.

Parkolás: a szálloda zárt parkolójában ingyenes.

Villa Hotel****

4032 Debrecen, Medgyessy sétány 4.

A szálloda a Nagyerdőn található, a villamos vonalától 5 perc sétára.

Az ár tartalmazza a svédasztalos reggelit, a Wellness ház használatát, valamint ingyenes WIFI használatot.

Parkolás: a szálloda parkolójában ingyenes.

Hotel Platán****

4030 Debrecen, Somlyai u. 10.

A szálloda Debrecen kertvárosi részén, a nemzetközi reptér közvetlen közelében található.

Az ár tartalmazza a büféasztalos reggelit és az Internet használatát.

Parkolás: a szálloda parkolójában ingyenes.

PARKOLÁS A HELYSZÍNEEN

A Kölcsey Központ alatt található mélygarázsban DKV díjszabás érvényes (280.- Ft/óra/szgk.).

Érkezéskor a jegykiadó készüléken nyomja meg a jegykiadó gombot, ekkor a készülék kiadja a parkolókártyát. A kártyát tartsa magánál, mert nélküle nem tudja kifizetni a parkolás díját és elhagyni a parkolóházat. Figyelem! Minden behajtás díjköteles.

Parkolási díjat a mélygarázsban elhelyezett díjfizető-automatánál tudja befizetni!

A parkolási díj kifizetése után 15 perc áll rendelkezésére a parkolóház elhagyására.

A kijárat sorompó előtt elhelyezett kártyaolvasó készülékbe helyezze be a parkolókártyáját, hogy a készülék ellenőrizze azt. A sorompó felnyílása és a zöld jelzőlámpa kigyulladás után elhagyhatja a parkolóházat.

PARKOLÁS DEBRECENBEN

Parkolójegy váltása a parkoló-automatáknál lehetséges.

További információk kérhetők a DKV Ügyfélszolgálatán (<http://dkv.hu>)

Díjfizetés a fizető automata vagy mobiltelefon segítségével is történhet.

VILLAMOS

Debrecen 1-es és 2-es villamosa a legtöbb szálloda és a kongresszus helyszíne között jó közlekedési alternatíva. (A Kölcsey Központhoz a Debrecen Plaza megállónál kell leszállniuk.)

JAVASOLT TAXI TÁRSASÁG

Főnix Taxi, 24 órás taxi szolgálat, telefon: 52/444-444, 20/3-444-444, 30/9-444-444, 70/2-444-555

PÉNZÜGYEK, SZÁMLÁZÁS

A megrendelt szolgáltatások költségeit a kiállításra kerülő számlán az érvényes jogszabályok szerint tüntettük fel. Számlamódosítás, új számla kiállítása a kongresszus végéig, legkésőbb 2018. március 24-ig lehetséges. Ezen időpont után nem áll módunkban a megrendelésén és az erről kiállított számlán változtatni.

LEMONDÁSI, MÓDOSÍTÁSI FELTÉTELEK

Esetleges lemondást szálláslemondás esetében 2017. december 13-ig, a részvételi díjak és étkezések esetében pedig 2018. január 18-ig fogadtunk el kötbérmentesen, azonban a számlamódosítási díjat levonjuk a visszafizetendő összegből. A megadott időpontok után díjvisszafizetés nem lehetséges.

Módosítások, lemondások miatti számlamódosítások díja a rendezvényt megelőzően 2 500 Ft+Áfa. A rendezvényt követően kizárólag a számla formai módosítása lehetséges, melynek díja 4 000 Ft+ÁFA.

KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK

Szervezőirodánk a hotel, szálláshely szolgáltatásokat és az étkezéseket, vendéglátó szolgáltatásokat változatlan formában közvetíti megrendelői felé. A lemondási- és kötbér feltételeket a szolgáltatók feltételeihez igazítva alakítjuk ki.

FELELŐSSÉG- ÉS EGYÉB BIZTOSÍTÁS

A kongresszus közzétett részvételi és egyéb díjai nem tartalmaznak baleset, betegség, poggyász és felelősségbiztosítási díjat. Így baleset, betegség és valamely káresemény bekövetkezése esetén a szervezőknek nem áll módjukban semmilyen felelősséget vagy kártérítést vállalni.

- 1 Kölesey Központ
- 2 Sportdiagnosztikai,
Életmód- és Terápiás Központ
- 3 Hotel Lycium
- 4 Hotel Aquaticum
- 5 Centrum Hotel
- 6 Hotel Divinus
- 7 Hotel Óbester
- 8 Platán Hotel
- 9 Hotel Nagyerdő
- 10 Villa Hotel
- 11 Vasútállomás
- 12 Autóbusz-pályaudvar





Roche

RoActemra®: A teljes remisszió lehetősége akár MTX nélkül is¹

Bővebb információért olvassa el a gyógyszer alkalmazási előírását: www.ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis. Az aktuális árak tekintetében kérjük, ellenőrizze a www.neak.gov.hu honlapon a Publikus gyógyszertörzs – lakossági tájékoztató alatt található információkat. A dokumentum zárásának időpontja: 2017.08.30.

¹Gabay C, et al. Lancet 2013; 381: 1541–1550.

Roche

További információ:

Roche (Magyarország) Kft. 2040 Budaörs, Edison u. 1.
Tel: 06-23-446 800, Fax: 06-23-446 860
Email: hungary.medinfo@roche.com
Internet: www.roche.hu

 **RoACTEMRA®**
tocilizumab

A SZERVEZŐ BIZOTTSÁG CÍME

Főszervező:

Prof. Dr. Szekanecz Zoltán
DE OEC Belgyógyászati Intézet
Reumatológiai Tanszék
4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel./Fax: 52/255-091
E-mail: szekanecz.zoltan@med.unideb.hu

Szakdolgozó tudományos program főszervező:

Dr. (jur.) Domján Andrea
DE OEC Belgyógyászati Intézet
Reumatológiai Tanszék
4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel./Fax: 52/255-091
E-mail: domjan.andrea@gmail.com

A SZERVEZŐ IRODA CÍME

CONGRESS & HOBBY SERVICE KFT.

Kongresszus- és Rendezvényszervező Iroda
6701 Szeged, Pf.: 1022.
Telefon: 62/484-531, 484-532
Fax: 62/450-014
E-mail: info@congress-service.hu
Web: <http://congress-service.hu>

A RENDEZVÉNY HONLAPJA

<http://congress-service.hu/2018/drop7>